


ARABIC SUMMARY



الملخص العربي

قصور الشرايين التاجية الغير مصحوب بآلام صدرية في الرجال المصابين بالبول السكري ويعانون من التهاب الجهاز العصبى اللاإرادى

فى هذه الدراسة تم دراسة ١٠٠ حالة منها ٨٠ مريضاً بمرض البول السكرى غير معتمدين على الإنسولين فى علاجهم ٤٠ منهم يعانون من إعتلال العصب اللاإرادى، ٤٠ آخرون لا يعانون منه ٢٠ أصحاء كمجموعة ضابطة وقد تم عمل لهؤلاء جميعاً فحوصات معملية اشتملت على سكر صائم وبعد الأكل بساعتين ومستوى الدهون بالدم ورسم قلب بالمجهود وقد بينت النتائج أن ٢٢ من ٤٠ مريضاً (٥٥%) الذين يعانون من السكر مع إعتلال العصب اللاإرادى لديهم ذبحة صدرية بدون ألم، ٢ فقط من الـ ٤٠ (٥%) مريضاً بالسكر بدون إعتلال العصب اللاإرادى لديهم ذبحة صدرية بدون ألم وكانت هناك علاقة إيجابية بين مدة السكر وإعتلال العصب اللاإرادى ولم تكن هناك علاقة إيجابية بين الذبحة الصدرية الغير مصحوبة بآلام صدرية ومستوى الدهون بالدم ونستخلص من هذه الدراسة أن قصور الشرايين التاجية الكامن يحدث أكثر مراراً فى مرضى السكر الذين يعانون من إعتلال العصب اللاإرادى عنها فى مرضى السكر الذين لا يعانون من إعتلال العصب اللاإرادى ويجب علاج هذا القصور فى أسرع وقت.