

فتوقات الحجاب الحاجز

تعتبر فتوقات الحجاب الحاجز من الأنواع قليلة الحدوث وتنقسم الى عدة أنواع

وهي : خلقية وأصابية ومكتسبة.

ويقسم النوع الخلقى الى :

١- الفتق الذى يمر من خلال فتحة (بوكدالك) ويعتمد على وجود قناة موصله بين الغشاء البللورى والبريتونى .

٢- الفتق الذى يمر من خلال فتحة مورجاجن ويعتمد على وجود خلل خلقى أثناء النمو بين أصل الحجاب الحاجز من الغضروف السيفى وغضاريف الضلوع وهذا الخلل يكون خلف الغضروف السيفى ويسمى (فتق مورجاجن) .

ويستلزم لتشخيص تلك الحالات إجراء فحوصات وأشعات عاجله قبل أن تتضاعف الحالة وتسوء ويرجع تحضير المريض قبل العملية تحضيراً جيداً إلى نجاح العملية وشفاء الطفل وتجنب المريض دخوله فى مضاعفات قد تؤدى بحياته .

الفتق الإصابى : ويحدث نتيجة أى جرح أو تمزق بالحجاب الحاجز نتيجة إصابه بآله حادة أو نافذه أو أصابه بآله غير حادة ويعتبر العلاج باكتشاف الجرح ووقف النزيف بمعالجة الجرح الموجود بالحجاب الحاجز ومعالجة أى أصابه أخرى من خلال عملية استكشاف .

ويقسم النوع المكتسب إلى ثلاثة أنواع :

- ١- النوع الأول : ويسمى الفتق المريئى (الفتق المنزلق) .
- ٢- النوع الثانى : ويسمى الفتق الجار مريئى (الفتق الحلزونى) .
- ٣- النوع الثالث : وهو نوع مشترك من الأول والثانى ويحدث النوع الأول فى حوالى ٩٠ ٪ من الحالات أما النوع الثانى لا يحدث منفرداً إلا فى حالات نادره وإذا حدث يكون بنسبة ٥ ٪ .

وينقسم علاج هذه الحالات إلى علاج طبي أو جراحى ويهدف العلاج الطبي إلى معادله الإرتجاع المعدى المرئى ويشمل انقاص الوزن وتنظيم وجبات الطعام ومعادله الحموضه بواسطة أدويه وعند فشل العلاج الطبي يستلزم التدخل الجراحى لعلاج المريض .

والغرض من هذه الرساله هو مراجعه الباثولوجى وتشخيص وعلاج الأنواع المختلفه من فتوقات الحجاب الحاجز .