

تعتبر أورام الادرينوما من أورام الرئة الغير شائعة الحدوث ، وهذه الاورام تحصل من السمات المميزة التي تجعلها وسطا بين الاورام الحميدة والاخرى الخبيثة .

وموضوع هذه البحث يشمل ١٥ حالة من هذه الاورام التي عولجت خلال الخمسين سنوات الماضية حيث يحتل هذه المدة نسبة ٥.٦ % من مجموع أورام الرئة المختلفة وتحتل الاناث نسبة ٢٦ % من العدد الكلي للحالات ، وتتراوح أعمار المرضى بين ١٥ و ٥١ عاما .

ويعتبر للتنزيف للرئوي المتكرر من أهم أعراض الادرينوما حيث لوحظ حدوثه في ١٣ مريضا يليه السعال الذي قد يكون مصحوبا بالقيح ثم الالتهاب الرئوي المتكرر مع آلام بالصدر وضيق وتتراوح فترة المعاناة من هذه الأعراض من ٣ شهور الى ٦ سنوات وقد أجريت لهؤلاء المرضى دراسة شاملة من حيث الفحص الاكلينيكي الكامل وعمل أبحاث كأشعة على الصدر وأشعة بالصبغة على الشعب الهوائية ومنظار للشعب الهوائية وتحليل للبصاق حيث أمكن تشخيص الورم قبل اجراء العملية الجراحية في ١٢ حالة منها . وكان عدد الاورام في الرئة اليمنى ثمانية وفي الرئة اليسرى ستة وحالة واحدة في القبة الهوائية .

ثلاث عشرة مريضا عولجوا جراحيا حيث تم استئصال الرئة في ثلاثة حالات واستئصال فصين في أربعة حالات واستئصال فص واحد في ستة حالات وعولجت حالتان بالاشعة العلاجية .

من هذا البحث نستنتج أن ورم الادرينوما يجب توقعه في أشخاص في منتصف العمر يشكون من سعال و تنزيف رئوي متكرر أو التهاب رئوي متكرر . مثل هؤلاء المرضى يجب اجراء أبحاث شاملة عليهم من أشعة عادية للصدر وأخرى بالصبغة ومنظار شعبي وحتى اذا لم يعرف التشخيص بعد هذه الأبحاث يجب أن يوضع المريض تحت العناية الطبية الدورية

حتى يتم الوصول الى التشخيص الصحيح .

ونستنتج ايضا أن العلاج الجراحي ما زال هو الافضل بالنسبة لورم الابد. يوما
حيث يتم استئصال الورم والجزء المصاب من الرقبة ولذلك نجنب العرض الاعراس
الناجمة من تلف الجزء من الرقبة خلفت الورم