

المخلص العربى

تعد البواسير الشرجية أحد أكثر الأمراض شيوعاً وتأثيراً على الإنسان . ورغم وجود العديد من الأساليب لعلاج البواسير الشرجية إلا أن الجراحة أثبت أنها أنسب طرق علاج البواسير الشرجية المتقدمة من الدرجة الثالثة والرابعة .

وقد وجد أن الجراحة التقليدية فى حالات البواسير الشرجية من الدرجة الثالثة والرابعة تسبب فى العديد من المرضى بعض المضاعفات . وعلاج البواسير الشرجية بواسطة الدباسة إحدى الطرق الجديدة لتلافي هذه المضاعفات كما وصفها لونجو سنة ١٩٩٨ .

وقد أجريت هذه الدراسة على ١٠٠ مريض بالبواسير الشرجية من الدرجة الثالثة والرابعة وقد تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات .

- المجموعة الأولى : تم إجراء الجراحة بواسطة الدباسة .
- المجموعة الثانية : تم إجراء الجراحة بواسطة الحلقات المطاطية .
- المجموعة الثالثة : تم إجراء الجراحة بواسطة طريقة غرزة جودسول .
- المجموعة الرابعة: تم إجراء الجراحة بواسطة الجراحة التقليدية .

وقد روعى إجراء التالى للمرضى قبل إجراء الجراحة :

- أخذ تاريخ مرضى كامل مع عمل فحص عام وفحص شرجى .
- عمل منظار شرجى .
- قياس وظائف قناة الشرج .

كما تم متابعة المرضى لمدة ثلاثة أشهر بعد إجراء الجراحة بواسطة :

- متابعة لقياس الآلام الناتجة عن الجراحة واحتياج المريض للمسكنات .
- متابعة مدى رضى المرضى وتقبلهم نتائج الجراحة ووقت استطاعتهم العودة إلى العمل ومدة إقامتهم بالمستشفى .
- متابعة حدوث أى مضاعفات .
- قياس وظائف قناة الشرج بعد ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة .

وقد أفادت الدراسة أن :

- الألام الناتجة عن الجراحة تكون أقل في المجموعات الثلاثة الأولى .
- احتياج المريض إلى مسكنات أقل في المجموعات الثلاثة الأولى .
- زيادة رضى المرضى وتقبلهم لنتائج الجراحة التى تمت فى المجموعات الثلاثة الأولى .
- فترة الإقامة بالمستشفى والوقت الذى يحتاجه المريض للعودة للعمل بصورة طبيعية أقل فى المجموعات الثلاثة الأولى .
- وجد أن إجراء الجراحة فى المجموعة الثلاثة الأولى لا يسبب أى تغيير فى وظائف قناة الشرج . فى حين وجد تغير فى وظائف قناة الشرج وهو معامل الانتظام لقناة الشرج أثناء الانقباض فى المجموعة الرابعة وذلك لحدوث تليف أثناء إلتئام الجرح بفتحة الشرج .
- الإحتباس البولى وجد أنه يحدث بنسبة أعلى فى المجموعة الرابعة عن باقى المجموعات الثلاثة الأولى .
- سجلت حالة واحدة من عدم التحكم البسيط فى عضلة الشرج فى المجموعة الرابعة فقط .
- حالات الارتجاع فى أعراض البواسير كانت ذو نسبة عالية فى المجموعة الثانية للمرضى ذات الدرجة الرابعة من البواسير الشرجية ولكن سجلت حالة واحدة فى كل من المجموعة الأولى والثالثة وحالتين فى المجموعة الرابعة .
- لم يحدث أثناء الدراسة أى مضاعفات كبرى فى كل المجموعات .

دراسة مقارنة بين الطرق الحديثة وطريقة مليجان مورجان فى علاج البواسير الشرجية

رسالة مقرومة من

الطبيب / محمد عبد الحكيم منصور

ماجستير فى الجراحة العامة

توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى الجراحة العامة

تحت إشراف


أ.د/ حامد رشاد مسلم

أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة
كلية طب بنها

٤٦

أ.د/ محمد محمد مختار

أستاذ الجراحة العامة
كلية طب بنها



أ.م.د/ حمدي أحمد عراقي

أستاذ مساعد الجراحة العامة
كلية طب بنها

أ.م.د/ أحمد حامد عبد المقصود

أستاذ مساعد الجراحة العامة
كلية طب بنها

كلية طب بنها

جامعة الزقازيق