

الملخص العربي

١٠٧٠٠٦١٣

٣٠ مريض حالتهم الصحية حرجة يعانون من كسر ما بين

المدورين ، تم تثبيت الكسر باستخدام المثبت الخارجي .

من مجموع المرضى، ١٨ كانوا اناث و ١٢ كانوا رجال

، قسمت انواع الكسر باستخدام طريقة ايفان حيث: ٤ مرضى

كانوا بعانون من كسر من النوع الأول ، و ١٢ مريض بعانون

من كسر من النوع الثاني ، و ٤ من النوع الثالث ، و ٦ من

النوع الرابع ، و ٢ من النوع الخامس ، و ٢ من النوع السادس

.

٢٦ كسر كان بسبب سقوط و ٤ كسور كانوا بسبب حادث سيارة. ١٨ كسر من هذه الكسور كانوا على الناحية اليسرى و ١٢ كسر كانوا على الناحية اليمنى.

متوسط وقت العملية حوالي ٢٨ دقيقة (يتراوح من ١٥ الى ٤٥ دقيقة). متوسط وقت استخدام الأشعة في العمليات كان حوالي ٦٦ ثانية (يتراوح من ٤٥ الى ١٠٠ ثانية). لم نحتاج الى نقل دم لأى مريض . وتم التئام الكسور في كل الحالات، وكان ذلك في متوسط ١٢ اسبوع (يتراوح ما بين ٩ اسابيع و ٢٠ اسبوع).

اما بالنسبة للنتائج ، فكانت نتائج وضع التئام الكسور في الأشعة ممتازة في ٢٢ مريض، و جيدة جدا في مريضين، و مقبولة في ٥ مرضى.

بالنسبة للنتائج الحركية ، فكانت ممتازة في ١٦ مريض، و جيدة جدا في ١٢ مريض ، و مقبولة في ٢ مرضى.

اختيار طريقة التخدير كان حسب الحالة الصحية للمريض حيث كان ١٨ مريض من الدرجة الثالثة و ١٢ مريض من الدرجة الرابعة .

كان متوسط اختيار وقت العملية بعد حوث الكسر هو اسبوعان (يتراوح ما بين اسبوع و ٣ اسابيع). سمح لكل المرضى بعد اجراء العملية ان يجلسوا في الفراش في اليوم التالي

للعملية. و ابتداء المشى بالمشية فى خلاللا أول ٣ اسابيع من

العملية.

متوسط وقت اليقاء فى المستشفى بعد العملية هو ٣ اسابيع (

يتراوح ما بين ٢ اسبوع و ٤ اسابيع). زكان زمن متاعية المريض

هو ٦ أشهر.

استخدمنا ٣ أنواع من المثبتات الخارجية، وبعد شد المريض على

طاولة العمليات و بعد رد الكسر المغلق ، تم وضع عدد من ٢

الى ٣ مسامير في عظمة عنق الفخذ ومن ٢ الى ٥ مسامير في

غضمة الفخذ.

التهاب المسامير وجد في ١٠ مرضى وكلها كانت سطحية مع

سهولة علاجها بالتنظيف اليومى للجهاز و المضادات الحيوية.

لم يمت اي مريض في خلال وجودهم بالمستشفى ومات ٣

مرضى بأسباب صحية أخرى ليس لها علاقة بالعملية في خلال

فترة التابعة وهي ٦ شهور.
