

الملخص العربي

قد زاد معدل الولادة القيصرية خلال العشرين سنه الاخيرة حيث وصل المعدل فى نهاية سنة ٢٠٠٣ من ١٥ % الى ٢٥ %.

ولكن محاولات الولادة الطبيعية بعد مرة واحدة من الولادة القيصرية زادت ايضا وذلك للمتابعة الجيدة للمرأة الحامل التي لديها تاريخ عن ولادة مرة واحدة قيصرية حيث وصلت النسبة من ٨٥% : ٥٥% .

وسوف يتم تقييم الندبة السفلية للرحم باستخدام الاشعة فوق صوتية عن طريق المهبل حيث اذا وصل سمك هذه الندبة الى ٢ مم او اكثر فهذا دليل على التئام جيد للجرح وامكانية الولادة الطبيعية لهذه المرأة بامان .

وفي هذه الدراسة التي شملت مائة امرأة حامل ولها تاريخ عن ولادة قيصرية مرة واحدة ومتابعة هذه الحالات باستخدام الاشعة فوق الصوتية لكي نقيم الجرح الرحمى فى اسفل الرحم قبل بدء عملية الولادة الطبيعية حيث يتم عمل السونار فى الفترة من ٣٧ الى ٤٠اسبوع من الحمل .

وفي هذه الدراسة قد تم عمل الاتى الى جميع المرضى :-

- ١-تم اخذ تاريخ كامل من السيدة الحمل عن الولادة السابقة .
- ٢-تم فحص عام وفحص خاص للرحم .
- ٣-الفحوصات الروتينية وفحوصات خاصة وأهمها الأشعة فوق صوتية .

وقد وجد من النتائج لهذا الفحص الآتي:-

من نتائج فحص ١٠٠ امرأة حامل ولها تاريخ عن ولادة سابقة مرة قيصرية حيث تتراوح اعماهم بين ٢٢ : ٤٠ سنه في الفترة من ٣٧ : ٤٠ اسبوع من الحمل وجد الآتي :-

- ١ ٣٤ سيدة (٣٤%) الندبة الجراحية للجزء السفلي هي ٢ مم.
- ٢ ٣٩ سيدة (٣٩%) الندبة الجراحية للجزء السفلي من ٢ : ٢٠.٥ مم.
- ٣ ٢٧ سيد (٢٧%) الندبة الجراحية للجزء السفلي أكثر من ٢٠.٥ مم .

وقد تمت هذه النتائج باستخدام الاشعة فوق الصوتية عن طرق المهبل.

و قد تم ولادة ٣٧ امرأة ولادة طبيعية بدون تتشيط و ٢٤ امرة تمت ولادتها بمساعدات

الولادة كالشفاط والولادة القيصرية الضرورية حدثت مع ٣٩ امرأة وذلك للأسباب الآتية:

- ١- فشل في التقدم في الولادة الطبيعية .
- ٢- وجود ألم في ندبة الجرح.
- ٣-اضطرابات تؤثر على حياة الجنين.

توجد عوامل عديدة قد تؤثر على الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية وهي :-

- ١- ان يكون سن المريضة اقل من ٤٠ سنه.
- ٢-ان يكون سبب القيصرية غير متكرر.
- ٣-ان يكون اتساع عنق الرحم اكثر من ٤ سم .

٤- ان يكون سبق للمربيضة الولادة الطبيعية الجيدة.

وفي النهاية نستخلص ان:-

الولادة الطبيعية بعد الولادة القيصرية امنة الى حد كبير طالما تحققت الشروط الالزامية وتم اختيار المريضة بدقة وبعد تقييم اكلينيكي شامل والمتابعة الالزامية للام والجنين خلال عملية الحمل و الولادة .

استخدام الموجات فوق الصوتية في تقييم كفاءة ندبة القيصرية بالجزء السفلي من الرحم قبل بدء الولادة

رسالة مقدمة من

الطيبية / أميرة محمود محمد حلاوة

للحصول على درجة "الماجستير"
في أمراض النساء والتوليد

تحت إشراف

أ.د/ عبد الفتاح إبراهيم حجازى

أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب بنها

أ.د/ محمود عبدالله عبد الفتاح

أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب بنها

د/ عماد الدين محمود عبد المجيد

أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد كلية طب بنها

جامعة بنها
كلية الطب

٢٠٠٩ م