

الملخص العربي

ارتفاع الضغط ذاتي الاعتلal داخل الجمجمة هو متلازمة متعددة الأعراض يتميز بصداع شديد وقيء وفقدان بصري مؤقت ورؤية مزدوجة.

ارتفاع الضغط ذاتي الاعتلal داخل الجمجمة هو المصطلح المستخدم عندما لا يوجد أي أورام حقيقة داخل الدماغ و كان يسمى سابقا ورم المخ الكاذب ؛ و معدل انتشار هذا المرض أكثر بين السيدات وبالاخص الذين يعانون من السمنة .

إن تشخيص هذا المرض يعتمد على ثلاثة أشياء وهي: ارتفاع بحمة العصب البصري, ارتفاع الضغط الداخلي للدماغ بدون سبب ثانوي و سلامة الأشعة المقطوعية والرنين المغناطيسي.

يؤدي ارتفاع حلمة العصب البصري نتيجة ارتفاع الضغط ذاتي الاعتلal إلى تدهور وظائف الإبصار , وهذا يظهر في البداية في صورة تدهور في مجال الإبصار ثم يليه تدهور في حدة الإبصار و الذي إن لم يتم علاجه سيصاب المريض بضمور في العصب البصري و فقدان تام للإبصار.

إن علاج ارتفاع الضغط ذاتي الاعتلal داخل الجمجمة يهدف إلى تقليل زيادة الضغط الداخلي للدماغ وهناك عدة طرق للعلاج منها ما هو علاج دوائي ومنها ما هو علاج جراحي. هناك العديد من العمليات الجراحية التي تستخدم

لتقليل زيادة الضغط الداخلي للدماغ. وبالرغم من نجاح العديد من هذه العمليات في تقليل زيادة الضغط الداخلي للدماغ، فقد سجل العديد من حالات تدهور وظائف الإبصار.

وهذا يدل على إن تدهور حدة الإبصار يحدث نتيجة لعوامل في الجزء الحاجي من العصب البصري ، ولذا فإنه يجب أن تكون الجراحة – والتي الغرض منها علاج تدهور حدة الإبصار- موجهاً لهذا الجزء.

على الرغم من عملية تحويل ناجحة لسائل النخاع الشوكي يكون هناك فقدان مستمر للبصر. فقد أثبتت الدراسات أن عملية إزالة الضغط من أغشية العصب البصري هو إجراء آمن ومؤثر وميسور لعلاج فقدان البصر الناجم عن مرض ارتفاع الضغط ذاتي الاعتمال داخل الجمجمة بعد فشل العلاج الطبي.