

الملخص العربي

يعتبر هرمون النمو من الهرمونات التي تساعد على تكاثر الخلايا في الإنسان والحيوان . يتربّك هذا الهرمون من 191 حمض اميني يتم تخليقه وافرازه من الغده النخامية الاماميّه والتى تقع تحت تأثير المراكز العليا بالمخ. يقوم هرمون النمو على تنشيط الخلايا مباشرة عن طريق التأثير على مستقبلات الهرمون على سطح الخلايا ، هذه المستقبلات تلتصل بالهرمون بعد افرازه من الغده النخامية في مجرى الدم وبذلك يتم تنشيط هذه الخلايا ، ولكن معظم تأثير الهرمون يكون عن طريق عامل النمو المشابه للأنسولين رقم 1 والذي تم تكوينه بعد تأثير الهرمون على الكبد ليتم افرازه .

تأثير الهرمون فسيولوجي يشمل عدة أجهزة وانظمه حيث يقوم بالعديد من التأثيرات على التمثيل البنائي في خلال حياة الإنسان وبما انه هرمون بنائي يقوم على تخلق البروتينات في العضلات، حيث ان حجم العضلات يزيد عند اعطاء هرمون النمو لمن عندهم نقص في نسبة الهرمون في اي فئه عمريه.

يساعد هرمون النمو على عملية استطاله العظام حيث تقوم الخلايا الاولية الغضروفية بالانقسامات والاصطفاف في اعمده في القرص النامي ثم تنضج هذه الخلايا وتتحول الى خلايا عظميه ، ولقد وجد ان هذا الهرمون يقوم على زيادة عدد الخلايا بالغضاريف والانسجه اكثر من زيادة حجمها ، كما يقوم بتأثير مباشر على الخلايا العظميه ليس فقط بتكاثر الخلايا ولكن ايضا بتنشيط الوظائف لهذه الخلايا.

وبدراسة تأثير جرعات هرمون النمو الدوائية على كسور عظمة القصبة للبالغين أوضحت الدراسة أنه لا يوجد تأثير واضح في اجمالي الكسور المغلقة والمفتوحة، بينما أوضحت أيضاً أنه في الكسور المغلقة (وهي الأكثر) يقوم هرمون النمو بشكل واضح على سرعة بناء لحام العظام.

عوامل النمو المتحكمة في نمو الخلايا توجد تحت عدة مسميات مثل الهرمونات، عوامل النمو أو إنزيمات الخلايا.

عوامل النمو ومنها عامل النمو المحول بيتا والبروتين المخلق للعظام وعامل نمو الفيبروبلاست وعامل النمو مشابه الأنسولين وعامل النمو المشتق من الصفائح الدموية وعامل نمو العصب فهي تختلف في مسامتها على حسب الوظيفة التي تؤديها أو المصدر المفرز لها.

عامل النمو المحول بيتا وهو يفرز من خلايا الأورام، يتميز بقدرته على إستثارة الخلايا الغير سرطانية وعلى إحداث تحولات شكلية بها وهذه الخاصية غير دائمة التأثير حيث أن التغيرات التي تحدث في الخلايا يمكن إنعكاسها بعد إزالة عامل النمو المحول بيتا، وعامل النمو المحول بيتا وتفاعلاته البيئية يتداخل في كثير من عمليات الخلايا وتطوراتها و ذلك في الجنين النامي والشخص البالغ مثل نمو الخلية وتباعينات الخلايا وتمارضها ونمو خلايا جديدة للمحافظة على وظيفة العضو وكثير من وظائف الخلية.

عوامل النمو في مجموعة عامل النمو المحول بيتا ومنها البروتين المخلق للعظام تعتبر من أكثر البروتينات التي تمت دراستها في مجال تطوير الأجنة وإنماء العظام البالغة وقد أعطت نتائج واعدة في إسراع إنماء العظام

ويعتبر عامل النمو البروتين المخالق للعظام من البروتينات القادرة على تخليق العظام الجديدة من خلال قدرته على تحويل الخلايا الجزعية إلى الخلايا المكونة للعظام.

عامل نمو الفيبروبلاست يتميز بقدرته على الإرتباط بمستقبلات الإتصال بين الهيبارين والجلوكوز أمينوجليكان على الخلايا ويتميز بقدرته على تخليق الأوعية الدموية ويساعد على نمو الخلايا الجزعية وتميزها إلى تكوين النسيج الطلائي والخلايا المكونة للعظام والخلايا المكونة للغضاريف والخلايا المكونة للعضلات ويوجد منها نوعان هما عامل نمو الفيبروبلاست الحمضي أو ألفا وعامل نمو الفيبروبلاست القاعدي أو بيتا.

عامل النمو مشابه الأنسولين هو بروتين مكون من ترتيب للأحماض الأمينية مشابه لبروتين هرمون الأنسولين وهو متداخل في نظام إتصال الخلية بالبيئة الفسيولوجية المحيطة لها ويوجد منه نوعان هما عامل النمو مشابه الأنسولين 1 و عامل النمو مشابه الأنسولين 2 الذي يعتبر عامل نمو جنيني حيث أنه يوجد بكمية ملحوظة في خلايا الأجنة وحديثي الولادة ثم تتضائل كميته بعد ذلك بينما عامل النمو مشابه الأنسولين 1 هو البروتين الرئيسي المسؤول عن إستجابة الخلية لهرمون النمو.

عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية هو أحد عوامل النمو المسئولة عن إنقسام الخلية ونموها و له دور في نمو الأجنة وتضاعف الخلايا وتنقلاتها ونمو الأوعية الدموية و له علاقة بعديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين والأمراض السرطانية وتشوهات الأنسجة وهو مسؤول عن تكوين النسيج الضام.

عامل نمو العصب هو بروتين يقوم على حيوية الخلايا العصبية كماله دور مهم في نشاط الخليه العصبيه ونموها ,ويقوم ايضا بتنظيم نمو المحور العصبي للخلية الحسيه في اصابات الخلايا العصبية او في نمو البراعم المصاحبه للنهايات العصبيه غير المصابه وقد لوحظ انه في حالة نقص نسبة عامل نمو العصب في مرضى السكر يقل نسبة بناء المحاور العصبيه وظهور التهابات الاعصاب الطرفيه .

لهذا يوجد اهتمام متزايد بالتطبيقات الإكلينيكية لعوامل النمو في مجالات إصلاح العظام منها الإسراع في إلتئام الكسور وخاصة في المرضى المعرضين لخطر عدم القدرة على إلتئام الكسور وتأخرها وأيضا علاج مثل هذه الحالات وفي حالات التثبيت الأولى للفقرات وعلاج حالات المفاصل الكاذبة بين الفقرات وفي مجالات الهندسة الوراثية لعلاج حالات فقدان أجزاء كبيرة من العظام الطويلة وأيضاً حالات علاج غضاريف المفاصل.

وتعتبر دراسات تطبيقات إستخدام عوامل النمو في إصلاح كسور العظام مع دراسات الهندسة الوراثية والخلايا الجزعية من الدراسات الوعادة بيولوجيا.

عند اختيار الحامل المناسب لعوامل النمو لابد من مراعاة بعض الاشياء منها قدرة توصيل عامل النمو في وقت وجراحته مناسبه , وجود قوام مناسب لتقوية الخليه واستحاثة الخلايا كيميائيا للوصول اليها , وجود مكان لتنقل الخلايا ونمو الاوعيه الدمويه , كما يتطلب قدرة نظام التوصيل على التقتلت مع عدم وجود رد فعل مناعي او انتاج اي مواد سمية قد تمنع عملية التئام العظام.

ومن امثلة استخدام عوامل النمو فى استثارة نمو العظام وجد انه يساعد على تكوين عظام وانسجه رخوه فى الفراغ ما بين الوتر والعظم فى مفصل الكتف مما زاد من قوة التحام الوتر بالعظم فى 6 الى 12 اسبوع ,ما شجع على استخدامها مع المرضى الذين يعانون من مشاكل التئام العظام او وجود التهابات بالاوთار او هشاشة العظام .

وقد اظهرت بعض الدراسات انه باستخدام جرعة واحدة من البروتين المخلق للعظم رقم 2 بالحقن من الخارج يزيد من التآم العظام مما زاد استخدامها عمليا لسهولتها وقصر مدة الوقت التى تحتاجها فى التآم العظام واستعادة الوظائف الحركية فى اقرب وقت .