

الملخص العربى

يعتبر الإلتهاب الصديدى لمفصل الفخذ العلوى، عامة، مرض قليل الحدوث نسبيا، ولكنه يصيب الأطفال حديثى الولادة والأطفال الرضع أكثر من الصبية أو البالغين. وتنشأ خطورة هذا الإلتهاب من أن المضاعفات التى تتبع حدوثه كثيرة وذات تأثير مدمر على وظيفة مفصل الفخذ.

من خلال تفحص الأبحاث المنشورة حول هذا الموضوع، تم شرح المعلومات الأساسية الخاصة بتشريح مفصل الفخذ العلوى وكيفية الإصابة بالإلتهاب ونوعية الميكروبات المسببة وطريقة وصولها للمفصل وأيضا أعراض الإصابة بالإلتهاب وطرق تشخيصه وعلاجه، وكذلك المضاعفات التى تنتج عنه.

ففى سبيل تقييم العلاج المبكر للإلتهاب الصديدى على وظيفة مفصل الفخذ، تم إجراء هذه الدراسة، والتى إشمطت على ٣٠ حالة إلتهاب صديدى لمفصل الفخذ العلوى فى الأطفال حتى عمر سنتين. تم تجميع تلك الحالات من قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعى، ويمكن تلخيص أهم وأبرز ما توصل إليه البحث من نتائج فيما يلى:

تبين من خلال هذه الدراسة أن أهم الأعراض المبكرة هى عدم تحريك الطفل للمفصل على الإطلاق فيما يعرف بالشلل التحاذب، وكذلك الألم الشديد من أى تحريك سلبى للمفصل. كما أظهرت الدراسة أيضا أن حجم العلامات المميزة بعد عمل الأشعة هى وجود خلع جزئى أو كلى للمفصل بالأخص فى الأطفال الرضع. وأوضحت الدراسة أيضا أن الأشعة التليفزيونية لمفصل الفخذ ذات فائدة عظيمة فى تشخيص وجود السائل الصديدى داخل المفصل بينما