

بسم الله الرحمن الرحيم

الملخص العربي

تم اجراء هذه الدراسة الاستقصائية لدراسة هيئة مرض الروماتويد المفصلي في المرضى المصريين .

لشملت الدراسة علي ١١٦٩ مريض يعانون من مرض الروماتويد المفصلي طبقا للمواصفات المعجلة للجمعية الأمريكية للروماتيزم .

وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي :

- ☐ كانت نسبة المرضى الذكور الي المرضى الاناث ٢٠:٩٠ .
- ☐ كان متوسط أعمار المرضى هو ٤٢.٢٧ سنة .
- ☐ كان متوسط عمر المرضى عند بداية ظهور المرض هو ٢٨.٨٢ سنة .
- ☐ كان تاريخ المرض العائلي ايجابيا في ٧٤.٦٥% من الحالات .
- ☐ كان هناك عامل مساعد علي ظهور المرض في ٨٢.٤٠% من الحالات .
- ☐ كانت مفاصل اليدين هي أكثر المفاصل تعرضا للإصابة عند بداية ظهور المرض .
- ☐ كان ٢٢.٤٥% من المرضى يعانون من وجود تشوهات .
- ☐ كان انشاء مفصل الكوع هو أكثر التشوهات شيوعا في الحالات المدروسة (٢٢.٠٧%) .
- ☐ كان هناك ٤٩.١٧% من المرضى يعانون من أعراض خارج المفاصل .
- ☐ كان جفاف الفم هو أكثر الأمراض الخارج مفصلية شيوعا (٢٦.٧٢%) يليها جفاف العينين (٢٩.٠٧%) بينما كان التهاب الأوعية هو أقل تلك الأعراض شيوعا (٢.٠٦%) .
- ☐ معظم حالات الدراسة (٦١.٠١%) كانت تعاني من عجز بسيط (المرحلة الثانية) طبقا لتقسيم شتاينبروكر لدرجة المقدرة الوظيفية .
- ☐ كان اختبار عامل الروماتويد ايجابيا في ٦٨.٧٥% من المرضى .
- ☐ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات مدلول احصائي بين المرضى الذين كان يحتوي مصل دمهم علي عامل الروماتويد والمرضى الذين لم يكن يحتوي مصل دمهم علي عامل الروماتويد وذلك من حيث نسبة إصابة المفاصل ، القدرة الوظيفية أو وجود أعراض خارج المفاصل .

□ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات مدلول احصائي بين المرضى من مختلف الأعمار من حيث نسبة إصابة المفاصل والمقدرة الوظيفية بينما كانت نسبة الإصابة بالتشوهات أعلى في المجموعة التي تعرضت للإصابة بالمرض مبكرا وكان الفرق بينهما وبين مجموعات الأعمار الأخرى ذات مدلول احصائي هام .

نستطيع أن نستخلص من هذه الدراسة أن مرض الروماتويد المفصلي في المرضى المصريين ذو طابع معتدل إلى حد ما . وصورة المرض في المرضى المصريين لا تختلف كثيرا عن صورته في باقي الشعوب عدا غياب الأعراض الجهازية الخطيرة والتي تهدد حياة المريض وذلك في المرضى المصريين .