

الملخص العربي

يعتبر سرطان خلية الكبد أكثر سرطانات الكبد الأولية إنتشاراً. وهو ثالث السرطانات انتشاراً في الرجال وخامس السرطانات انتشاراً في النساء. وهو ثالث السرطانات سبباً للوفاة في العالم بعد سرطان الرئة وسرطان المعدة. وفي مصر هناك زيادة في معدل حدوث سرطان خلية الكبد بين المرضى المصابين بأمراض الكبد المزمنة.

وقد يكون الشكل الظاهري لسرطان خلية الكبد على شكل بقعة صغيرة أو بقعة كبيرة أو بقع متشرة خلال الكبد.

وقد يكون الشكل المجهرى لسرطان خلية الكبد على شكل جيد الانحدار أو متوسط الانحدار أو ردئ الانحدار أو نمو جديد غير مرتبط بإنحدار.

وينتشر سرطان الكبد فوق سن الأربعين ، وهو أكثر في الرجال من النساء. وأهم الأعراض الأكالينيكية قد تكون ألم في الجانب الأيمن العلوي في البطن ، فقدان الشهية ، قيء ، قيء دموي ، فقدان الوزن ، إصفرار العين ، تضخم بالכבד ، صوت اضطراب شريانى مسموع على الكبد ، استسقاء بالبطن ، تضخم بالطحال.

ويشمل تشخيص سرطان خلية الكبد الطرق الآتية:

- ١) دلالات سرطان خلية الكبد: وأشهرها نسبة الفافيتوبروتين في الدم > 400 نجم/مل يشخص سرطان خلية الكبد الأولى.
- ٢) الأشعة على البطن: على سبيل المثال الموجات فوق الصوتية ، الأشعة المقطعيّة ، أشعة الرنين المغناطيسي أو تصوير الأوعية الدموية لسرطان خلية الكبد.
- ٣) سحب عينة من الورم من خلال جلد المريض.
- ٤) منظار البطن مصحوباً أو غير مصحوب بموجات فوق صوتية على البطن.
- ٥) فتح استكشافي في البطن مصحوب أو غير مصحوب بموجات فوق صوتية على البطن.
- ٦) قياس وظائف الكبد الأساسية.
- ٧) قياس وظائف الكبد الديناميكية.
- ٨) قياس سريان الدم إلى الكبد وقياس الضغط في الوريد البابي الكبدي.

- ويتم علاج سرطان خلية الكبد عن طريق إحدى الطرق الآتية:
- ١) استئصال الورم.
 - ٢) زراعة الكبد.
- ٣) علاج عن طريق جلد المريض: حقن إيثانول في الورم / تدمير الورم عن طريق الذبذبات الموجية.
- ٤) علاج عن طريق الشرايين المغذية للورم.
- حقن مواد تحدث تجلط في الشرايين المغذية للورم.
- حقن مواد تحدث تدمير وتجلط في الشرايين المغذية للورم.
- ٥) علاج بالأدوية المضادة للأورام.
- ٦) علاج للأعراض فقط في الحالات المتأخرة من المرضى المصابين بسرطان خلية الكبد.
- ويتم التنبؤ بمستقبل المرضى المصابين بسرطان خلية الكبد عن طريق إحدى الطرق الآتية:
- ١) الأسباب المؤدية للورم.
 - ٢) نوع الورم.
 - ٣) سلوك الورم.
- ٤) أشياء تتعلق بنوع المريض المصاب بالورم.
- ٥) أشياء تتعلق بنوع العلاج الذى يتلقاه المريض المصاب بالورم.
- ويتم منع حدوث سرطان خلية الكبد الأولى عن طريق احدى المستويات الآتية:
- ١) المستوى الأول: على سبيل المثال منع علاج الالتهاب الفيروسي الكبدي بي أو سي.
 - ٢) المستوى الثاني: على سبيل المثال مادة الاولتيبراز.
 - ٣) المستوى الثالث: على سبيل المثال مادة الجليكيريزين.

تقييم موقف سرطان خلية الكبد في مصر رسالة مقدمة من

**الطبيب / هلال عبد السلام عبد الغنى
بكالوريوس الطب والجراحة**

**دراسة بحثية مقدمة بغرض الحصول
على درجة الماجستير في طب الباطنة العامة
تحت إشراف
أ.د/ عبد الشافى محمدى طبل**

**رئيس قسم الباطنة العامة - استاذ الأمراض الباطنة
كلية الطب - جامعة بنها**

**أ.د/ نبيل السيد عطية خطاب
أستاذ الأمراض الباطنة
كلية الطب - جامعة بنها**

**أ.د/ توحيد محمد موافي
أستاذ الأمراض الباطنة
كلية الطب - جامعة بنها**

**كلية الطب البشري بنها
جامعة بنها
٢٠١٠**