

الملخص العربي

طوره الأشعة المقطعية في تحديد درجة انتشار سرطان المستقيم

مقدمة:

إن الكشف المثالي عن السرطان المستقيم يحتم تحديد الأشخاص الأكثر تعرضاً للإصابة بالمرض ويعتبر سرطان المستقيم هو السبب الثاني للوفاة بسبب السرطان بعد سرطان الرئة عند الرجال أما عند النساء يعتبر السبب الثالث للوفاة بعد سرطان الرئة والثدي.

إن تناول كميات كبيرة من الدهون في الوجبة الغذائية يعتبر من المصاحبات لسرطان الأمعاء الغليظة.

وتعتبر الأشعة العادية على الصدر والأشعة بالموجات فوق الصوتية على البطن من الفحوص الأساسية لتحديد درجة انتشار السرطان. وتعتبر الموجات الصوتية مكمل للفحص الأكلينيكي.

وإن أفضل وسيلة للبحث تشمل منظار المستقيم مع أخذ عينات منه والفحص بالباريوم المزدوج وتحديد كمية الدم الغير منظور بالبراز.

أما الأشعة المقطعية المبرمجة فتعتبر ذات فائدة في تحديد جزئية الورم وكذلك درجة انتشاره في الأنسجة المتاخمة له بالإضافة لكونه الأشعة المقطعية المبرمجة وسيلة رخيصة نوعاً ما فإنها أيضاً ذات قدرة عالية في تشخيص ثانويات الغدد الليمفاوية بالحوض والبطن وأيضاً في أخذ عينات من الورم.

٢٠

ماور الاشعة المقطعية في طباط مارجة انتشار سرطان المستقيم



رسالة مقصودة من

المطبيب / سعيد ابو الحبيب ابو الحبيب امداد

المجلة التخصصية في طباط مارجة المارسة
في الاشعة المقطعية

اشراف

أ. ح. / نبيل عبد المنعم مشهور

استاذ الاشعة المقطعية
مخبر الطب المارسة العامة

أ. ح. / أحمد فريد يوسف

مدرس الاشعة المقطعية
مخبر الطب المارسة العامة

قسم الاشعة المقطعية

مخبر الطب المارسة

جامعة القاهرة

١٩٩٥

