

تقييم النساء المصابات بالنزف الدموي بعد الجماع بواسطة مسحه مهبلية ومنظار عنق الرحم

رسالة

توطنه للحصول على درجة الماجستير في النساء والتوليد

مقدم من

**الطيبية/ شيرين محمد ابراهيم حسن
بكالوريوس الطب والجراحة**

المشرفون

**د/نور الدين إبراهيم عشماوى
أستاذ النساء والتوليد
كلية الطب
جامعة بنها**

**د / محمد عبدالسلام محمد
أستاذ النساء والتوليد
كلية الطب
جامعة بنها**

**د/محمد عبدالهادى محمد
أستاذ م. النساء والتوليد**

**كلية الطب
جامعة بنها**

**كلية الطب
جامعة بنها
٢٠١٠**

الشخص العربي

توجد أسباب عديدة للنزف الدموي من المهبل بعد الممارسة الجنسية مثل :

- وجود قرحة على سطح عنق الرحم ، مما يساعد على رشح الدماء من الشرابين السطحية
- نمو شاذ في عنق الرحم
- زوائد لحمية في عنق الرحم
- زوائد لحمية رحمية ، وتحدث عندما تتمو بطانة الرحم وتسبب نتوءات
- اورام ليفية رحمية حميدة
- عدوى بكتيرية ب الكلاميديا
- داء المشعرات المهبلية
- عدوى فطريات المهبل ، ويصاحبها حكة وحرقان و رائحة كريهة وافرازات مهبلية
- التهاب بطانة الرحم
- السيلان
- التهاب المهبل
- تناول حبوب منع الحمل لسنوات طويلة
- اضطراب الدورة الشهرية لأسباب نفسية هرمونية
- مرض سرطاني خبيث

الغرض من الدراسة

تقييم الحالات من النساء المصابةين بالنزف الدموي من المهبل بعد الممارسة الجنسية وذلك بالفحص الاكلينيكي واخذ مسحه من المهبل ثم الفحص بمنظار عنق الرحم .

طرق الدراسة

سوف تتم الدراسة على النساء المصابين بالنزف الدموي من المهبل بعد الممارسة الجنسية وسوف يتم اختيار الحالات من المرضى المتربدين على قسم النساء والتوليد بمستشفى بنها الجامعي

سوف يتم عمل فحص اكلينيكي و اخذ مسحة من المهبل وسيتم اختيار الحالات التي تظهر مؤشرات خلايا متغيرة لدراستها بواسطه بمنظار عنق الرحم.

و قد تم ادراج ملفات ٥٠ سيدة النساء المصابين بالنزف الدموي من المهبل بعد اجراء الممارسة الجنسية من لهم نتائج فحص خلوى ونتيجة فحص بمنظار عنق الرحم و نتيجة نتيجة لعدم ملائمة الفحص الهيستوباثولوجي. و عند تحليل النتائج احصائيا تم استبعاد العينات للفحص الهيستوباثولوجي.

وقد اظهرت هذه الدراسة وجود فرحة على سطح عنق الرحم و التهاب المهبل و زوائد لحمية في عنق الرحم (بولبيات عنق الرحم) السبب الاساسي في النزف الدموي بعد الجماع بنسبة ٨٤% وبذلك أظهرت نتائج الدراسة ان ورم الحليمي البشري عالي بشكل ملحوظ بالمجموعه الغير طبيعيه بالفحص الهستولوجي

وقد اوصت هذه الدراسة بضرورة خضوع كل النساء المصابين بالنزف الدموي من المهبل بعد الجماع للفحص الخلوى .