

## **الملخص**

### **العربي**

### **الملخص العربي**

اشتملت الدراسة الحالية على ١٠٠ مريض من مرضى قصور الشريان التاجي الحاد بوحدة رعاية القلب بمستشفى بنها الجامعى وهدفنا فيها دراسة نسبة الحدوث والاتجاهات المحتملة لعوامل الخطورة في مرضى قصور الشرايين التاجية بمستشفى بنها الجامعى في الفترة من سبتمبر ٢٠٠٩ إلى فبراير ٢٠١٠.

اشتملت الدراسة ١٠٠ مريضاً من بينهم ٦٦ من الذكور (٦٦٪) و ٣٤ من الإناث (٣٤٪).

وتتنوع حالات قصور الشريان التاجي بين المرضى حيث كان هناك ٣٨ مريضاً (٣٨٪) يعانون من جلطة بالشريان التاجي مصحوبة بارتفاع مقطع الـ (ST)، ١٩ مريضاً (١٩٪) يعانون من جلطة بالشريان التاجي غير مصحوبة بارتفاع مقطع الـ (ST) ، و ٥١ مريضاً (٥١٪) يعانون من ذبحة صدرية غير مستقرة.

وتم دراسة نسبة عوامل الخطورة بين المرضى حيث وجد أن ٥٥٪ مدخنون، ٤٢٪ يعانون من مرض السكري ، ٥٠٪ من مرضى ارتفاع ضغط الدم الشريانى، ٥١٪ يعانون من ارتفاع نسبة الدهون بالدم، ٤٪ يعانون من السمنة وكان ٢٢٪ لديهم تاريخ عائلى إيجابي من أمراض الشرايين التاجية.

ووجد في مرضاناً أن الصدمة القلبية حدثت في ٤٪ من المرضى، إحياء سكتة قلبية في ٪٢ ، ارتشاح رئوي في ٤٪ وعدم انتظام ضربات القلب في ١٢٪ من المرضى ولم يكن هناك حالات وفيات في الدراسة الحالية.