

## الملخص العربي

إن ارتفاع ضغط السائل المخى الغير محدد السبب يتميز بـ ارتفاع ضغط السائل المخى أكثر من مائى وخمسين (مم مائى) مع ظهور أشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطوعية على المخ بصورة طبيعية. ويكون مصحوباً بارتشاح العصب البصري أى تورم العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط السائل المخى وليس لأسباب خاصة بالعصب البصري كحدوث التهاب أو ضغط خارجى على العصب البصري.

الصداع والغثيان والقيء وقد النظر المؤقت من علامات هذا المرض بالإضافة إلى تأثر مجال الأ بصار للمريض ويتطور ارتشاح العصب البصري مع الوقت خاصة مع عدم علاج المريض بالأسلوب الأمثل لحالته ونتيجة لذلك يحدث ضمور بالعصب البصري وفقدان البصر.

لذلك فمن الضروري تقييم حالة المريض جيداً لمعرفة طريقة العلاج المثلى له: ويتم هذا التقييم عن طريق الآتى:

- ١- فحص المريض إكلينيكياً جيداً.
- ٢- عمل فحص مجال الأ بصار للمريض.
- ٣- فحص للسائل المخى.
- ٤- عمل أشعة على المخ كأشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطوعية على المخ.

حتى يثنى لنا استبعاد الأسباب الأخرى المشابهة لارتفاع ضغط السائل المخى الغير محدد السبب ومنها أورام المخ وتشوهات الأوردة والشرايين وتشوهات العصب البصري؟

وحتى يتم تقييم الحالة جيداً واختبار الطريقة المثلى للعلاج كالتالى:

في الحالات الأولية وفيها حدة الأ بصار و مجال الأ بصار جيد مع ظهور تورم بالعصب البصري وارتفاع بضغط السائل المخى نبدأ بالعلاج الدوائى مع إنقاص الوزن للمريض.

في حالة عدم تحسن المريض على العلاج الدوائى وتدهور النظر وتأثير مجال الأ بصار للمريض. أو اكتشاف الحالة من البداية كارتشاح شديد بالعصب البصري وتأثير النظر و مجال الأ بصار بشدة يكون العلاج الجراحي هو الأمثل.