

الملخص العربي

إن نبات الكركديه له تأثيرات دوائية عديدة .

وقد أجريت هذه الدراسة للمقارنة بين بعض تأثيرات مستخلص الكركديه و عقار الأنورفاستاتين على صوره الدهون بالدم .

كذلك فان هذه الدراسة أجريت أيضا للمقارنة بين مستخلص الكركديه و عقار الابنالابريل من حيث تأثير كل منها على ضغط الدم داخل الجسم .
أيضا فان هذا العمل قد اجرى لدراسة تأثير مستخلص الكركديه على القلب، الشريان الأورطي، والأمعاء المعزولين من الأرنب.

بالنسبة للدراسة التي أجريت داخل الجسم فان فئران التجارب قد قسمت إلى مجموعتين :المجموعة الأولى الضابطة (بدون إضافة كوليستيرول للطعام)، المجموعة الثانية(بإضافة الكوليستيرول للطعام والتي انقسمت إلى :المجموعة الأولى(ذات مستوى الكوليستيرول المرتفع بدون علاج). المجموعة الثانية(المعالجة بعقار الأنورفاستاتين 10 مجم/كجم يوميا عن طريق الفم) ، والمجموعة الثالثة (ذات مستوى الكوليستيرول المرتفع المعالجة بمستخلص الكركديه بجرعة 250 مجم/كجم يوميا عن طريق الفم) ، والمجموعة الرابعة (ذات مستوى الكوليستيرول المرتفع المعالجة بمستخلص الكركديه بجرعة 500 مجم/كجم يوميا عن طريق الفم)، والمجموعة الخامسة (ذات مستوى الكوليستيرول المرتفع المعالجة بمستخلص الكركديه بجرعة 1000 مجم/كجم يوميا عن طريق الفم).

هذا وقد تم إحداث ارتفاع مستوى الكوليستيرول تجريبيا باستخدام غذاء عالي الدهون كوليستيرول 2 جرام/كجم المذاب في زيت الذرة (لمدة شهرين، وفي نهاية مدة الدراسة تم قياس مستويات الكوليستيرول والبروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة والكثافة المرتفعة و الدهون الثلاثية .

و قد وجد أن مستخلص الكركديه و عقار الأنورفاستاتين لهما تأثير ذو دلالة إحصائية في خفض مستوى الكوليستيرول و البروتينات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة و، وارتفاع مستوى البروتينات الدهنية ذات الكثافة المرتفعة .

بالنسبة لدراسة التأثير على ضغط الدم فقد قسمت الفئران إلى أربع مجموعات متساوية :المجموعة الأولى (بقيت بدون عقار)، المجموعة الثانية(ذات ضغط الدم المرتفع ، المجموعة الثالثة (ذات ضغط الدم المرتفع المعالجة بمستخلص الكركديه بجرعة 250 مجم يوميا

عن طريق الفم)، والمجموعة الرابعة (ذات ضغط الدم المرتفع المعالجة بعقار الاینالابريل بجرعة 30 مجم/كجم يوميا عن طريق الفم) وقد تم إحداث نموذج لضغط الدم المرتفع عن طريق ربط شريان الكلى اليسرى للفئران لمدة أربعة أسابيع وفي نهايتها تم قياس ضغط الدم الانقباضي والمتوسط .

وقد وجد أن مستخلص الكركديه له تأثير غير ذي دلالة احصائية على ضغط الدم مقارنة بعقار الاینالابريل الذي كان له تأثير ذو دلالة إحصائية في خفض ضغط الدم الانقباضي والمتوسط .

أما بالنسبة للدراسة التي أجريت على الأعضاء المعزولة فإن مستخلص الكركديه كان له تأثير مثبت على انقباضات عضلة القلب المعزول من الأرنب، وهذا التأثير المثبت كان من خلال مستقبلات المسكريين .

كذلك كان له تأثير انبساطي على الشريان الأورطي المعزول من الأرنب، ولم يتغير هذا التأثير الانبساطي عند استخدام الاتروبين.

وعلى الأمعاء المعزولة للأرنب كان له أيضا تأثير مثبت على حركة الأمعاء، وهذا التأثير لم يكن عن طريق أي من مستقبلات الأدرينيلين .

ويستنتج من هذه الدراسة أن مستخلص الكركديه فعال ويمكن استخدامه في علاج ارتفاع الدهون بالدم ، كما يمكن استخدامه في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لما له من تأثير مضاد للدهون .

وبناءا على ما تقدم و من خلال نتائج هذه الدراسة فإنه ينصح باستخدام الكركديه في علاج ارتفاع ضغط الدم و ارتفاع مستوى الدهون في الدم. و هذه الدراسة تحتاج إلى المزيد من الدراسات الإكلينيكية لاعادة تأكيد ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج .