

ملخص الرسالة

بعض الطرق لعلاج التهاب البروستات البكتيري المزمن

- مازال التهاب البروستات البكتيري المزمن مرضا محيرا للأطباء وذلك نتيجة لعدم
السميات في التشخيص والعلاج .
- أجرى هذا البحث على ٤٠ مريض من مرض التهاب البروستات البكتيري المزمن الذين
تم اختيارهم من مرضى العيادة الخارجية بمستشفى منها الجامعي على أساس :
(١) الفحص المجهري لافراز البروستاتا .
(٢) عمل مزرعة وحساسية لافراز البروستات .
- تم تقسيم المرضى الى ثلاث مجموعات علاجية :
المجموعة الاولى : حيث يعطى المريض أقراص سونترم أو أرثروبسيس مع عمل
جلسات تدليك البروستات مرتين أسبوعيا - لمدة ٦ أسابيع .
المجموعة الثانية : مثل الاولى مع حقن البورونيستين عن طريق الفتحة الخارجية
لمجرى البول بعد عمل جلسة التدليك .
المجموعة الثالثة : وذلك بالحقن الموضعي للبروستات بأحد المضادات الحيوية
على أساس المزرعة والحساسية .
- (النتائج)
.....
- (١) تحسن ١٢ / مريض بالمجموعة الاولى التي تضم ٢٤ مريض بنسبة تحسن ٧١ % .
- (٢) تحسن ٢ مريض من المجموعة الثانية التي تضم ٦ مريض بنسبة تحسن ٣٣ % .
- (٣) تحسن ٧ مريض من المجموعة الثالثة التي تضم ١٠ مريض بنسبة ٧٠ % .
- ويؤي هذا بالتشخيص المبكر حيث أن نتائج العلاج تكون أكثر ايجابية .
- يستحسن علاج الحالات المبكرة عن طريق عمل جلسات تدليك للبروستات مع إعطاء
المريض مضاد حيوي على أساس المزرعة والحساسية .
- وتعالج الحالات المزمنة عن طريق الحقن الموضعي للبروستات بأحد المضادات الحيوية
على أساس المزرعة والحساسية .