

Arabic summary

(التغيرات الشكلية في المستقيم بعد تحويله الى شانه بوليه بعد عليه

الاستئصال الكلى للشانه في مرض سرطان الشانه البلهارسى)

هذه التغيرات الشكلية في المستقيم

- قد درست في فترة تتراوح بين ستة أشهر وست سنوات وأكثر
- وجدنا أن هناك بعض التغيرات التأقلمية في صورة ضمور كلى وفقدان لخلايا (الجوبلت) وقلل في افراز المخاط في (الكريت) وهذا سبب اقلل افراز المخاط الذى كان يصاحب البول بعد عليه تحويل المستقيم كشانه بوليه بعد العملية بستة أشهر .
- وهناك أيضا تغيرات في صورة التهاب مزمن .
- ويوجد أيضا تسطح في الطبقة المخاطية للمستقيم وتحورها الى تغيرات تأقلمية من خلايا بطنة طويلة الى خلايا بطنة متعددة الطبقات . وأهميه هذه التغيرات التأقلمية هي الحماية من امتصاص البول وتقليل نسبه حدوث عدم انتظام في حيويه كيمائيات وحموضة الدم .
- وهناك أيضا زيادة في عدد شكل الخلايا في شكل أورام حميدة وأورام خبيثة أيضا ومن الممكن حدوث نزيف لا يمكن التكم في السيطرة على ايقافه ، وهذا ممكن أن يكون أول شكوى يأتى بها هؤلاء المرض . فيجب على هؤلاء المرض أن يتابعوا طبيا ، وتعمل لهم مناظير كل فترة معينه بعد العملية (كل ستة أشهر) لمعاينه أية تغيرات سرطانية خطيره قبل حدوث أية مضاعفات .