

الملخص العربي

إن عصيات السودوموناس هي مُمرض شائع يسبب عدوى المستشفيات في وحدات العناية المركزية. ولكن ظهور عصيات السودوموناس المقاومة للمضادات الحيوية يعد تهديداً جديداً يواجهه المرضي. ونظراً لزيادة انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، يجب على المختبرات الإكلينيكية التركيز أكثر فأكثر على وبائيات عدوى المستشفيات المكتسبة. إن تحديد نوع السلالة هو أداة مفيدة للغاية في تتبع انتشار عدوى المستشفيات.

في هذه الدراسة حاول إلقاء الضوء على مصادر وانتشار عصيات السودوموناس في وحدة العناية المركزية للبالغين. وقد تم تصنيف سلالات عصيات السودوموناس المعزولة من عينات المرضى وعينات بيئية مأخوذة من وحدة العناية المركزية للبالغين بمستشفى بنها الجامعي باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل ذو البادي العشوائي وتفاعل البلمرة المتسلسل المعتمد على العامل إريك للتحري عن العلاقات المحتملة. كما تم عمل اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية المختلفة كنوع آخر من أساليب التصنيف وشملت اختبارات لانتاج إنزيم البيتا لاكتاميز ذي المدى الممتد وإنزيم البيتا لاكتاميز الفلزي.

وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :

كانت 50 % من عينات المرضى إيجابية لعصيات السودوموناس. وكان أعلى معدل للعزل من عينات البصاق (62 %).

كانت 33 % من العينات البيئية إيجابية لعصيات السودوموناس. وكانت أعلى معدلات لعزل عصيات السودوموناس من كيس أمبو (100 %)، السماعة الطبية (100 %)، أنابيب جهاز الشفط (100 %)، ماء الصنبور / الحوض (80 %)، ومن الأراضي (75 %).

كانت 13 % من العينات المأخوذة من أيدي العاملين إيجابية لعصيات السودوموناس.

تم اختبار السلالات المعزولة لانتاج إنزيم البيتا لاكتاميز الفلزي باستخدام اختبار القرص المزدوج التازري للميروبينيم - إدتا و اختبار إيه. كلا الإختبارين أعطى نتائج متماثلة. وكان إنتاج إنزيم البيتا لاكتاميز الفلزي أعلى في عينات المرضى (92 %)، وأقل في العينات البيئية (19 %) ولم يتم الكشف عنه في العينات المأخوذة من الأيدي. وكان الفرق في التوزيع بين عينات المرضى من جهة والعينات البيئية وعينات الأيدي من جهة أخرى ذات دلالة إحصائية.

كان هناك اختلاف واضح في المقاومة للمضادات الحيوية بين السلالات المنتجة لإنزيم البيتا لاكتاميز الفلزي وغير المنتجة. وكانت البكتيريا المنتجة أكثر مقاومة لجميع المضادات الحيوية التي تم اختبارها. وكان الاستثناء الوحيد هو الكوليستين الذي أبدى جميع السلالات سواء المنتجة لإنزيم أو غير المنتجة تقريراً حساسية له.

وأظهرت سلالات عصيات السودوموناس المعزولة 7 أنماط حساسية للمضادات الحيوية تم تسميتها A1-A7. أنماط الحساسية للمضادات الحيوية تراوحت من نمط A1 وهو نمط حساس لجميع المضادات الحيوية إلى نمط A7 وهو نمط مقاوم لجميع المضادات الحيوية باستثناء الكوليستين.

جميع سلالات عصيات السودوموناس المعزولة تم تصنيفها جينيا باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل ذو البدئ العشوائي. وتم الحصول على سبعة أنماط، تتالف من 2 حتى 7 نطاقات تراوحت بين 200 إلى 2000 زوج قاعدي.

حقق تفاعل البلمرة المعتمد على العامل إريك من 1 إلى 5 نطاقات. وترواح حجم النطاقات من 75 إلى 7000 زوج قاعدي. كل السلالات المعزولة أمكن تصنيفها باستخدام هذا الاختبار و تم الحصول على ثمانية أنماط اريك.

أعطى التصنيف المعتمد على اريك مؤشراً للقدرة التمييزية (0.7955) يزيد على مؤشر تفاعل البلمرة المتسلسل ذو البدئ العشوائي (0.7706)، بينما أعطى التصنيف المعتمد على كليهما أعلى المؤشرات. أما أدنى المؤشرات فكانت من نصيب التصنيف المعتمد على اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية (0.7232).

لعب كل من المياه/الصنبور وجهاز الشفط دوراً رئيسياً في انتشار عصيات السودوموناس في وحدة العناية المركزية. وقد تم رصد علاقة وبائية جزيئية بين المياه/الصنبور وأيدي العاملين بالوحدة وكذلك خزان مياه جهاز التنفس الصناعي. بينما تم الكشف عن ارتباط وبائي بين جهاز الشفط وكلاً من الأواني الطبية والسماعات الطبية.

كان المياه/الصنبور وجهاز الشفط مرتبطين معاً وبائيَا وكلاهما مرتبطة وبائيَا بالمرضى.

وقد ثبت أيضاً الرابط الوبائي بين المرضى وأنابيب أجهزة التنفس الصناعي.

كانت السلالات المنتجة لإنزيم البيتالاكتاميز الفلزي المعزولة من المرضى مرتبطة وبائيَا بالمياه/الصنبور وأنابيب جهاز الشفط.