

وقد تم عمل لهم الآتى :-

١- تاريخ مرضى كامل .

٢- فحص اكلينكى كامل .

٣- الفحوصات الآتية :-

أ- تحليل بول كامل .

ب- مزرعة بول

ج- صورة دم كاملة

د- بروتين س النشاط

هـ- أشعة تليفزيونية على البطن

و- مستوى البروكالستيونين قبل وبعد العلاج للحالات المصابة والسليمة

- وقد وجد الآتى بعد عمليات احصائية وتوزيع النتائج فى جداول

- ٣٦% من الحالات من الذكور ، ٦٤% من الحالات من الإناث .

- وأن متوسط أعمارهم ٩,٩ سنة ومتوسط ضغط الدم لهم ٦٠,٣/٩٥,٣ ، متوسط درجة

حرارتهم ٣٨,٣م ومتوسط عدد الخلايا الصديدية ١٠٢ فى البول

- ١٣% من الحالات مزرعتهم البولية سلبية ، ٨٧% مزرعتهم البولية إيجابية وعدد الدم

الأبيض والبروتين سى النشاط لم يكونوا فى مستوى التشخيص مثل سيرم

بروكالستيونين الذى وجدنا أنه ٢٠% من الحالات فقط لم يرتفع لكن ٨٠% قد ارتفع

وشخص مبكر أما سى بروتين النشاط ٤٠% لم يرتفع و ٦٠% فقط ارتفع وكذلك عدد

الدم الأبيض كما أن سيرم بروكالستيونين قد ميز التهابات مجرى البول العلوية عن

السفلية حيث أنه ارتفع فى العلوية ضعف السفلية وقد انخفض إلى النصف بعد العلاج

فى كليتا الحاليتين :

- نحن نوصى عمل سيرم بروكالستيونين لكل حالات التى نشك فيها بالتهابات مجرى

البول حتى نكتشفها مبكراً ويتم علاجها قبل المضاعفات خصوصاً بالمقارنة بالنسبة إلى

عدد الدم الأبيض وسى بروتين النشاط وكذلك مزرعة البول .

وقد تم عمل لهم الآتى :-

١- تاريخ مرضى كامل .

٢- فحص اكلينكى كامل.

٣- الفحوصات الآتية :-

أ- تحليل بول كامل .

ب- مزرعة بول

ج- صورة دم كاملة

د- بروتين سى النشاط

هـ- أشعة تليفزيونية على البطن

و- مستوى البروكالسيتونين قبل وبعد العلاج للحالات المصابة والسليمة

- وقد وجد الآتى بعد عمليات احصائية وتوزيع النتائج فى جداول

- ٣٦% من الحالات من الذكور ، ٦٤% من الحالات من الإناث .

- وأن متوسط أعمارهم ٩,٩ سنة ومتوسط ضغط الدم لهم ١٥٠,٣/٦٠,٣ ، متوسط درجة

حرارتهم ٣٨,٣م ومتوسط عدد الخلايا الصديدية ١٠٢ فى البول

- ١٣% من الحالات مزرعتهم البولية سلبية ، ٨٧% مزرعتهم البولية ايجابية وعدد الدم

الأبيض والبروتين سى النشاط لم يكونوا فى مستوى التشخيص مثل سيرم

بروكالسيتونين الذى وجدنا أنه ٢٠% من الحالات فقط لم يرتفع لكن ٨٠% قد ارتفع

وشخص مبكر أما سى بروتين النشاط ٤٠% لم يرتفع و ٦٠% فقط ارتفع وكذلك عدد

الدم الأبيض كما أن سيرم بروكالسيتونين قد ميز التهابات مجرى البول العلوية عن

السفلية حيث أنه ارتفع فى العلوية ضعف السفلية وقد انخفض إلى النصف بعد العلاج

فى كليتا الحالتين .

- نحن نوصى عمل سيرم بروكالسيتونين لكل حالات التى نشك فيها بالتهابات مجرى

البول حتى نكتشفها مبكراً ويتم علاجها قبل المضاعفات خصوصاً بالمقارنة بالنسبة إلى

عدد الدم الأبيض وسى بروتين النشاط وكذلك مزرعة البول .