




الملخص باللغة العربية

الملخص العربى

يعتبر الفتق الإربى من أكثر الفتوق شيوعا كما أن نسبة إرتجاعه بعد علاجه جراحيا تصل إلى (١٠ - ١٥ %)

و يمكن أن يكون الفتق المرتجع مماثلا للفتق الذى سبق علاجه أو يكون مختلفا عنه تشريحيا و تختلف طريقة علاج الفتق جراحيا من فرد لآخر و ذلك لظروف عديدة (كعمر المريض و عدد مرات إرتجاع الفتق و نوعه الخ) .

و أن أى عملية جراحية مهما كان نوعها تعتمد اعتمادا أساسيا على التخلص من العوامل المعرضة لإرتجاع الفتق و الا سوف يكون مصير العملية الفشل و يكون أيضا من الصعوبة بمكان إجراء عملية جراحية أخرى لأصلحه .

هدف البحث

يهدف البحث الى تقييم المرضى اكلينكيا و علاجهم جراحيا و وصف الوضع التشريحي الغير عادى أثناء الجراحة , و نوع العملية السابقة و الحالية و ما قد حدث من مضاعفات بعد إجراء الجراحة .

المرضى و طرق العلاج

- شمل البحث أربعين مريضا مصابين بفتوق اربية مرتجعة و تم تقسيمهم الى ثمانية مجموعات و علاجهم حسب البرنامج التالى :-
- تاريخ حدوث الفتق الاربى الاسبق و نوع العملية التى اجريت سابقا و عدد مرات الارتجاع و تاريخ الارتجاع .
- الفحص الاكلينكى الدقيق للمريض لاكتشاف العامل أو العوامل التى أدت الى إرتجاع الفتق الاربى بعد أصلحه .
- الفحوص المعملية اللازمة لكل حالة .
- نوع العملية الجراحية اللازمة و ما قد يحدث من مضاعفات بعد إجرائها ثم متابعة المرضى الدورية بعد أن اجريت لهم الجراحة لملاحظة و تدارك أية مضاعفات متقدمة كالالتهابات و التجمعات الصديدية و المائية بعد الجراحة أو مضاعفات متأخرة كإرتجاع الفتق أو ضمور الخصية .

النتائج و الملاحظات

- لكى تجرى عملية الفتق الاربى او الفتق الاربى المرتجع جيدا يكون لازما على الجراح معرفة الوضع التشريحي للفتق بهذه المنطقة بدقة فائقة و عليه أيضا ان يتجنب أية نزيف و السيطرة عليه اثناء الجراحة كما أن استعمال الدرائق له أهمية خاصة بعد إجراء جراحة الفتق الاربى المرتجع لوجود التصاقات نتيجة العملية السابقة و لما تسببه الجراحة السابقة من اختلال فى الاوضاع التشريحية اثناء التصليح و يجب استئصال الفتق جذريا عند ما يسمى (برقبة الفتق) .

- يجب عدم اصلاح الفتق الاربى من الناحيتين فى وقت واحد عند الكبار و ذلك نتيجة لعوامل عديدة كضعف الخلايا التى يتم تصليحها من الناحيتين و احتمال حدوث الالتهابات بعد التصليح او تورم الخصيتين و القضيب الشديدين و احتمال ارتجاع الفتق بعد الجراحة و ارد .

- لا يجب اصلاح الفتق الاربى المرتجع عند الذين يعانون من وجود اسباب ابتدائية لارتجاع الفتق بعد الجراحة و لا يمكن علاج هذه الاسباب عندهم الا تحت ظروف طارئة مع استعمال الشبكة الجراحية و الخيوط الغير قابلة للامتصاص بالجسم و يمكن فى هذه الحالات استئصال الخصية حالة تعدد مرات الارتجاع و فى المرضى كبار السن .