

الملخص العربي

مرض السكر من أمراض التمثيل الغذائي ينتج عن خلل في إفراز الإنسولين أو كفاءة عمله أو والاثنين معاً، إن إرتفاع نسبة السكر على المدى الطويل يؤدي إلى خلل في الوظائف الحيوية العامة بالجسم.

القدم السكري من أهم مشاكل مرض السكر، وهي من أهم أسباب حجز مرضى السكر بالمستشفى ، حيث إنه يوجد من ١٥٪:٢٥٪ من مرضى السكر يصابوا بقرح بالقدم خلال حياتهم.

مشاكل القدم السكري عالمية ولا توجد منطقة إلا وسجلتها ، وتكون تبعاً "لاعتلال الأعصاب الطرفية والأوعية الدموية الطرفية بالإضافة إلى العدوى وضعف السيطرة على مستوى السكر بالدم ، كل هذا يؤدي إلى جفاف الجلد وقد الإحساس ، وإنخفاض معدل الحركة مما يؤدي إلى زيادة حدوث قرح بالقدم وزيادة معدلات بتر الأطراف السفلية.

وقد وجد أن أكثر من نصف المرضى المبتورة أطرافهم يكون بسبب مرض السكر، بل إنه يتسبب في فقد الأطراف السفلية بمقدار ٣٠٪:١٠٪ عنه في عامه الناس ، و إن ٨٥٪ من المرضى المبتورة أطرافهم بسبب السكر قد اصيبيوا بقرح بالقدم.

إن معدل الوفيات بعد عملية بتر الأطراف السفلية بسبب السكر تصل إلى ١٥٪ بعد عام ، ٤٠٪:٥٠٪ بعد خمسة أعوام.

إن إكتشاف معدلات الخطورة التي تؤدي إلى مشاكل القدم السكري عن طريق الفحص المنتظم يؤدي إلى التقليل من حدوثها.

لابد من تعليم مريض السكر كيفية الحفاظ على قدمه وذلك من خلال الفحص الخاص بقدمه والحفاظ على مستوى السكر المناسب بالدم للمريض.

هناك إعتقاد بأنه يمكن تجنب مشاكل القدم السكري عن طريق المسح الشامل والمعالجة المتقدمة بواسطة فريق متخصص .

دراسة معدل انتشار القدم السكري

رسالة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في الباطنة العامة

مقدمة من

طبيب / محمود محمد علي عبد الرءوف
بكالوريوس الطب و الجراحة

تحت إشرافه

ا.د / محمد شوقي السيد
أستاذ أمراض الباطنة
رئيس قسم وحدة الغدد الصماء
كلية الطب. جامعة بنها

ا.د/ أحمد صالح
أستاذ أمراض الباطنة
كلية الطب. جامعة بنها

د/أيمن البدوي
مدرس أمراض الباطنة
كلية الطب. جامعة بنها

كلية الطب
جامعة بنها
٢٠١١