

الملخص العربي

دور الكورتيزون في علاج التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي دراسة تحليلية

إن التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي يعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً في مجال الأذن والأنف والحنجرة والتي تسبب ضعفاً في السمع خاصة في الأطفال. يعتبر التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي واحداً من أكثر الأسباب التي يطلب بسببها أكثر الآباء نصيحة الطبيب.

أسباب التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي متعددة ولكن السبب الأول هو فشل الوظيفة الرئيسية لقناة استاكيوس.

يتم تشخيص التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي بواسطة منظار الأذن الھوائي ومقاييس ضغط طبلة الأذن.

علاج التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي يتمثل في شقين :

- الشق العلاجي بدون جراحة.

- الشق الجراحي.

وفي دراستنا هذه اتبعنا أسلوب التحليل عن بعد لمعرفة نتائج علاج التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي باستخدام الكورتيزون وذلك بالخطوات التالية.

- تحديد هدف البحث وهو معرفة إن كان الكورتيزون فعال في علاج التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي أم لا.

- تحديد المقالات التي نشرت في هذا الموضوع من خلال البحث على شبكة الإنترنت في المجالات العلمية الطبية.

- تقييم المقالات حسب قائمة التقييم التي تم وضعها بالبحث.
- تجميع المعلومات ووضعها في قائمة التجميع التي تم وضعها بالبحث.
- تحليل هذه المعلومات عن طريق استخدام برنامج التحليل عن بعد

(RevMan5)

استخلاص النتيجة النهائية من هذا البرنامج.

وقد تم استخدام أسلوب التحليل عن بعد في خمسة ابحاث تم اختيارها من
مائة وواحد وسبعين مقالاً حسب الشروط التي وضعت مسبقاً.
وقد تم استخدام الكورتيزون في علاج التهاب الأذن الوسطى الإرثاشي عن
طرق الفم في ثلاثة أبحاث بإجمالي عدد حالات ٢٤٩ حالة و بالمقارنة بـ ٢٣٩
حالة لم يتم استخدام الكورتيزون معها
وكانت نتائج البحث على المدى القصير (٤ أسابيع) كالتالي :-

- في المجموعة التي تم استخدام الكورتيزون معها كانت نتائج الشفاء في عدد
١٢٢ حالة

- في المجموعة التي لم يتم استخدام الكورتيزون معها كان الشفاء في عدد
٥٧ حالة

وقد تم استخدام الكورتيزون الموضعي بالأذن في ثلاثة أبحاث بإجمالي عدد
حالات ٩٤ حالة تم استخدام الكورتيزون معها بالمقارنة بـ ١١٢ حالة لم يتم
استخدام الكورتيزون الموضعي معها
وكانت نتائج البحث كالتالي :-

في المجموعة التي تم استخدام الكورتيزون الموضعي معها كان الشفاء في عدد
٣٤ حالة بالمقارنة بـ ٢٨ حالة تم لها الشفاء في المجموعة التي لم تتعرض
للكورتيزون الموضعي

أما بالنسبة لنتائج استخدام الكورتيزون الموضعي على المدى المتوسط (٨ أسابيع) كانت النتائج كالتالي :-

تم استخدام الكورتيزون في عدد ٢ بحث بإجمالي عدد حالات ٣٩ تم استخدام الكورتيزون معها بالمقارنة بـ ٦ حالة لم تتعرض للكورتيزون وكانت النتائج كالاتي :-

عدد ٤ حالة تم لها الشفاء بعد التعرض للكورتيزون بالمقارنة بعدد ١٥ حالة لم يتم لها الاستجابة دون التعرض للكورتيزون وذلك بعد ثمانية اسابيع من العلاج وقد توصلنا من خلال نتائج هذا البحث :-

أن استخدام الكورتيزون عن طريق الفم أدى إلى نسبة شفاء أعلى من عدم استخدامه في علاج التهاب الأذن الوسطى الإرتشاحي وذلك على المدى القصير وكانت النتائج أفضل مع استخدام الكورتيزون عن طريق الفم

تأثير الكورتيزون في علاج إرتشاح الأذن الوسطى المزمن بالأطفال.

دراسة تحليلية

توطئة للحصول على درجة الماجستير في جراحة الأذن والأنف والحنجرة مقدمه من الطبيب

علاء عبدالله جوده

بكالوريوس الطب و الجراحة
كلية الطب جامعة بنها

تحت اشراف

الأستاذ الدكتور / احمد محسن سليمان

أستاذ جراحة الأذن والأنف والحنجرة
كلية الطب جامعة بنها

الأستاذ الدكتور / محسن محمود عبدالرازق

أستاذ جراحة الأذن والأنف والحنجرة
كلية الطب جامعة بنها

قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة جامعة بنها



جامعة بنها
كلية الطب البشري
قسم الأذن والأنف والحنجرة

2012