

ARABIC SUMMARY

الملخص المرفى

دراسة مقارنة لتقييم عقار جديد (ليدابريم) مع عقار آخر
(سبرتين) فى حالات النزلات الشمبية المزمنة مصحبه
او غير مصحبه بالسده الرئويه

١ - ٣٠ حالة تمانى المرحلة الحاده للنزلات الشمبية المزمنة ٢٣ ذكر
(٢ اناث بمستشفى جامعة القاهرة كانت موضوع هذه الدراسة
المقارنه وطريقه عشوائيه اختير ١٥ مريض للمعالج بمقار سلفاسترول
+ تريشوريم (ليدابريم) و ١٥ اخرى بمقار سلفا ميثوكساترول + تريشوريم
(سبرتين) .

فصل العلاج تم تقييم الابعاد التاليه :

أ) تاريخ المرض مضمنا المضاعفات الحيويه السابق اعطاؤها فى الثلاث
الاسباع الاخيره .

ب) فحص الكلىنىكى والفى .

ج) دراسه بكتريولوجيه للبصاق . دراسه حساسية الجراثيم التى تم
فصلها لكل من المقارين (ليدابريم) و (سبرتين) .

د) فحص مصلية : عد دم كلى ونوعى ونسبة الليموجلين - تحليل
بول كامل - نسبة كرياتينين فى الدم ونسبة انزيم الجلوتاميك
بيروك ترانساميناز .

هـ) قياس السعه الحيويه - كيمه هواء الزفير فى الثانيه الاولى والمقدرة
التفسيه القصوى فى الدقيقه .

و) قياس كيمه البصاق كل ٢٤ ساعة .

بمد علاج عشرة ايام تم دراسة نفس الابعاد لتقييم نتائج العلاج .

٢ - امكن فصل ٧ انواع مختلفه من البكتريا وقد وجد ان اكثرها تواجدنا

هى (البكتيريا السحبه ٦٦ر٦٦ %) تليها البكتيريا المنقوده ٦٦ ر ٤٦ %

وقد تم مناقشة الاختلاف فى النتائج المحليه والنتائج المنشوره بالخارج

٣ - وجد ان تأثير البكتيريا لمقار (اليدايريم) اقوى منه لمقار

(السهترين) بالاختبار المملى .

٤ - بمد عشرة ايم من العلاج باى من المقارين وجد انه لم تكسب اى

بكتيريا منه ضد اى منها .

٥ - هناك توافق بين اختبار الحساسية فى المملى والتجارب الاكلينيكيه لاي

المقارين .

٦ - مقارنة المقارين فى هذه الدراسة يرجح كفة عقار (ليدايريم) على

(سهترين) فى تقليل كميه البصاق وحنسواهد الصديدي .

وعلى الرغم من التجارب الاكلينيكيه والبكتيريولوجى الحسن وجد ان اختبارات

وظائف الرئه التى تم تقييمها لم تعطى تحسنا مذكورا .

لم تحدث اعراض جانبية مع اى المقارين .

يمكن اعتبار (ليدايريم) عقار مفيد وفعال لعلاج الطور الحاد

للنزلات الشعبيه المزمنه .