

الملخص العربي

المقدمة :

يعتبر السنط من الأورام الحميدة والتي تصيب الجلد بصفة شائعة وبصفة قليلة تصيب الأنسجة الظهارية وعادة السنط يصيب الأطفال والبالغين ويعتبر السنط من الأورام التي لها تكوين فيروسي والسنط من الأمراض التي تشفى تلقائياً ومع ذلك لابد من معالجة السنط خوفاً من انتشاره. وهناك أنواع مختلفة من السنط ويوجد طرق عديدة للعلاج الآن ومعظم هذه الطرق تعتمد على التدمير الكيميائي والفيزيائي وتشمل الكي الكيميائي والكي الكهربائي والكي بالتبريد ... إلخ.

ولكل طريقة من طرق العلاج مميزاتا وعيوبها والهدف الإكلينيكي من العلاج هو التدمير التام للسنط بدون أى مضاعفات.

الغرض من البحث :

الغرض من البحث هو التقييم والمقارنة بين ثلاث طرق لعلاج السنط الشائع وهي الكي الكيميائي والكي الكهربائي والكي بالتبريد وتقييم الأعراض الجانبية والمضاعفات لكل طريقة من طرق العلاج السابق.

المرضى والأسلوب فى العلاج :

هذه الدراسة شملت ٩٠ مريضاً يعانون من السنط الشائع مختلفين فى الأعمار وفى حجم ومكان إصابة السنط الشائع بالجسم وتم اختيار المرضى من العيادة الخارجية التابعة لقسمى الجلدية والتناسلية بمستشفى بنها الجامعى ومستشفى المنصورة الجامعى وتم تقسيم المرضى إلى ثلاثة مجموعات كل مجموعة تتكون من ٣٠ مريضاً وتم علاج كل مجموعة بإحدى طرق العلاج الآتية :

أ- الكي الكيميائي بحامض السلسليك بنسبة ١٦,٧% وحامض اللاكتيك بنسبة ١٦,٧% والكولوديون.

ب- الكي الكهربائي.

ج- الكي بالتبريد بالنيتروجين السائل بالرش.

وتم استخدام موانع للالتهابات وتصوير حالات قبل وبعد العلاج.

نتائج البحث :

مجموعة الذى بالتبريد مرضاها الثلاثون أتموا فترة العلاج جميعهم وكانت نسبة الشفاء فيه ٧٣,٣% أما مجموعة الكى الكهربائى تخلف مريضاً واحداً واستكمل ٢٩ مريضاً المتابعة وكانت نسبة الشفاء فيه ٦٥,٥%, أما مجموعة الكى الكيمائى فقد تخلف مريضان واستكمل ٢٨ مريضاً المتابعة وكانت نسبة الشفاء فيه ٦٤,٣%.

مضاعفات الكى بالتبريد (رش) تصل نسبتها إلى ٦,٦% وكانت فى صورة نقص صبغى أما مضاعفات الكى الكهربائى وصلت نسبتها إلى ١٣,٨% وكانت فى صورة ندب أما مضاعفات الكى الكيمائى فوصلت نسبتها إلى ١٧,٩% وكانت فى صورة ندب أيضاً.

الاستنتاج :

الكى بالتبريد أقل طرق العلاج الثلاثة من ناحية المضاعفات وأعلى نسبة شفاء يليها الكى الكهربائى ثم يأتى فى المرتبة الثالثة الكى الكيمائى والذى لا يحبذه المرضى لطول فترة العلاج المنتظم والذى تصل إلى ثلاثة شهور.