

الملخص العربي


أجرى البحث لدراسة التهاب الفطري المهبلي بالكانديدا البيضاء في السيدات الحوامل ، لذا فقد فحصت مائتي سيدة من الحوامل اللواتي يترددن على عيادة متابعة الحمل بمستشفى بنها الجامعي بثلاثة طرق لاكتشاف الالتهاب الفطري المهبلي بالكانديدا ، وهي طريقة النقطة المعلقة وصيغة الميثيلين الأزرق وصيغة الحبر .

وقد وجد أن نسبة وجود هذا الالتهاب في السيدات الحوامل تبلغ ٣٢% ، كما وجد أن ايجابية الفحص بطريقة الميثيلين الأزرق تبلغ ٩٣٫٨% وبالنقطة المعلقة ٨٩٫٣٧% وصيغة الحبر ٨١٫٢٥% ، غير أن هذه الفروق ليست لها قيمة احصائية ، كما وجد أن طريقة النقطة المعلقة هي الأسهل والأقل تكلفة .

وقد وجد أنه لا توجد علاقة احصائية بين انتشار الالتهاب المهبلي الفطري بالكانديدا بين الحوامل وسن المريضة أو عدد مرات حملها السابق .

وقد درست كل الأعراض والظواهر العارضة لهذا الالتهاب في الحالات الايجابية ووجد أن الأعراض تشتمل على الحكّة وزيادة الإفرازات المهبلية والألم أثناء الجماع وأثناء التبول .

وكذلك تمت دراسة تأثير معاملة الحموضة المهبلية على انتشار الفطر ، فوجد أن الفطر أكثر انتشاراً مع معاملة الحموضة . " " " " وثبت ذلك احصائياً .



السيد عبد اللطيف السيد البحار