

ملخص الرسالة

التهاب الزائدة الدودية الحادة

مضاعفات استئصالها

ان التهاب الزائدة الدودية الحاد لابد أن يؤخذ في الاعتبار في أى مريض يشكو من آلام البطن الحادة ، حيث وجد ان ٦% من الناس يمكن ان يصيبهم التهاب الزائدة الدودية في أى فترة من فترات حياتهم .

وليس هناك سبب محدد في حدوث التهاب الزائدة - ويمكن الوصول الى التشخيص من الاعراض والظواهر المرضية والابحاث ، الا ان هناك كثيرا من عوامل التشخيص المقارن لالتهاب الزائدة معظمها يتطلب علاجاً جراحياً ، وكثيرا من الامراض الباطنية بحسب أن تؤخذ في الاعتبار حيث ان العلاج الجراحى في مثل هذه الحالات لا يعود بالفائدة على المريض .

ويصل معدل حدوث الوفيات في حالات التهاب الزائدة الدودية الى اقل من ١% ، ولكن اذا تأخر العلاج وعند حدوث غرغرينا بالزائدة الدودية يرتفع الى ١٠.٦% ، وتصل الى ٥% في حالات انفجار الزائدة الدودية ، لاسباب في المرضى المسنين .

أن المضاعفات الناتجة عن استئصال الزائدة الدودية يمكن ان تحدث في ٥% من المرضى ، ولكن هذه النسبة يمكن ان ترتفع الى اكثر من ٣٠% من المرضى بعد استئصال الزائدة بالمنفجرة ، واكثر هذه المضاعفات هي التهاب الجرح ، وخراج الحوض وتحت الحجاب الحاجز والعشاء البريتونى ، وتكوين الناسور الخارجى وخراج الكيس والانسداد المعوى .

وليس هناك وسيلة لمنع حدوث التهاب الزائدة الدودية ولكن الطريقة الوحيدة لتقليل المضاعفات ومنع الوفيات هي اجراء عملية استئصال الزائدة قبل حدوث الغرغرينا