

المخلص العري

اشتمل هذا البحث على دراسة مدى انتشار اصابة الجهاز التناسلى الاسفل فى ٣٠٠ سيدة بمحافظة كفرالشيخ بالبحاريسيا . وقد تم الحصول على البيانات من العيادة الخارجية لقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفرالشيخ العام . وقد تم عمل الاتى لهؤلا السيدات:

١ = معرفة التاريخ العرضى

٢ = اجراء فحصا شاملا عاما

٣ = اجراء فحص (نسائى) لكل من الفرج الى المهبل وعنق الرحم

٤ = أخذت عينة من الجيب من الجيب الخلفى للمهبل ومن عنق الرحم وعمل منها شريحة وصبغت بصبغة البابا نيكولا للفحص الخلوى .

٥ = أخذت عينة من أى مرض موجود فى عنق الرحم أو المهبل أو الفرج (مثل القرحة والرقع الرملية والحمية ٠٠٠٠ الخ) للفحص الباثولوجى لوجود البلهارسيا .

٠٠ = وقد اتضح من هذا البحث أن ٢٣٢ سيدة (٧٧.٣٣ %) مصابة ببلهارسيا المجارى البولية وأن ٤٢ سيدة (١٤ %) مصابة بالبلهارسيا المعوية وأن ٢٦ سيدة (٨.٦٧ %) مصابة بكل من بلهارسيا الجهازى البولى وبالبلهارسيا المعدية .

= وقد وجد أن أكثر السيدات اصابة تتراوح أعمارهن بين ٢٠ الى ٣٠ سنة وأن أقلهن اصابة أقل من ٢٠ سنة أو أكثر من ٤٠ سنة . كما وجد أن ٦٣.٦٧ % من السيدات قد ولدن من ١ الى ٤ مرات وأن ٢٩.٦٧ % ولدن أكثر من ٥ مرات وأن ٦.٦٦ % لم ينجبن .

= وقد وجد أن ٨ سيدات مصابات ببلهارسيا الجهاز التناسلى الاسفل (٢.٦٦ % من السيدات) منهن ٤ سيدات (٣.٣٣ %) من السيدات مصابات بالبلهارسيا فى عنق الرحم ، كما وجدت اصابات المهبل فى حالتين (٢.٦٦ % من السيدات) وصابات الفرج فى حالتين (٢.٦٦ % من السيدات) .

وبدراسة العينات التى أخذت من الجهاز التناسلى الاسفل للسيدات اللواتى وجد أنهن مصابات ببلهارسيا الجهاز التناسلى الاسفل وجد أن ستة عينات كن فى شكل

٤ منهن فى عنق الرحم ، وواحدة فى المهبل وآخري فى الفرج • كما وجد أيضا عينة
فى شكل كتلة قرنبية فى الفرج •

= وبالفحص الخلوى وجد فى عينه واحدة فقط بويضة بلهارسيا البولى ويجوارها
لغيف من كرات الدم الحمراء والبيضا ، كما وجد فى شريحة أخرى بعض الخلايا
بها تحولات قبل سرطانية ، وهذه الشريحة مأخوذة من سيدة تعاني من بلهارسيا
فى عنق الرحم فى شكل لحمية •

= وهذا البحث يؤكد أن الجهاز التناسلى الاسفل للسيدات يعانى من الاصابة بالبلهارسيا •