

ARABIC SUMMARY

- ٣- في الحوامل تم التعرف على فطر الكانديدا في ٩ حالات (٥٦,٢%).
- ٤- في السيدات اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل تواجد فطر الكانديدا في مهبل ١١ حالة (٦١,١%).
- ٥- في مريضات السكر تبين إصابة ٥ حالات مهليا (٦٢,٥%) بفطر الكانديدا .
كما ثبت يوما لا يدع مجالا للشك - أن الحمل ومرض السكر واستخدام حبوب منع الحمل من العوامل الموصمة التي تزيد من نسبة الإصابة بهذا الفطر .
ويتصنيف أنواع الكانديدا المعزولة (٣٦ حالة) تبين أن فطر الكانديدا البيكانز هو أكثر الأنواع شيوعا حيث تواجد في ٣١ حالة (٨٦,١%) بينما تم التعرف على فطر الكانديدا ستيلاتويدا في حالتين (٥,٦%) و كانديدا جلابريت في حالتين أيضا (٥,٦%) و كانديدا اتروبيكالز في حالة واحدة (٢,٧%).
- ومناقشة النتائج التي تم التوصل اليها من اجراء اختبارات الحساسية على أنواع الكانديدا المعزولة وباستخدام أربعة أنواع من المضادات الفطرية الشائعة تبين ما يلي :
- ١- غار النستاتين كان أمد وأكثر المضادات تأثيرا في فطر الكانديدا فلقد كان شديد التأثير في ٥٥,٦% من الحالات ومتوسط أو ضعيف التأثير في ٤١,٧% و عديم التأثير في ٢,٧% فقط .
- ٢- أتى غار المكوستان ، ولتطابه تركيبه تقريبا مع النستاتين ، في المرتبة التالية فلقد كان شديد التأثير في ٥٠% من الحالات ومتوسط أو ضعيف التأثير في ٤١,٧% و عديم التأثير في ٨,٣% .
- ٣- غار الامفوتريوسين بي جاء في المرتبة الثالثة حيث أحدث تأثيرا شديدا في ٤٧,٣% من الحالات وتأثيرا متوسطا أو ضعيفا في ٤٤,٤% وكان بلا تأثير في ٨,٣% .
- ٤- كان غار الجريزوفلفين هو أقل المقارنات تأثيرا على فطر الكانديدا حيث لم يحدث تأثيرا شديدا سوى في ٥,٦% وكان متوسط أو ضعيف التأثير في ٧٢,٢% بينما ثبت عدم فاعليته في ٢٢,٢% من الحالات .

دراسة على تواجده فطر الكانديا المصلي في الصحة والمرض

مع تقييم لثأثير المضادات الفطرية المختلفة



دراسة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير
في العلوم الطبية (الميكروبيولوجيا)

من
الطبيب / هالة محمد رشاد

لمشرفون

الأستاذ الدكتور

حماؤ كاسم نافع

أستاذ ورئيس قسم البكتريولوجيا
كلية طب أسيوط

الأستاذ الدكتور


محمد وهدي عطي

أستاذ ورئيس قسم البكتريولوجيا
كلية طب بنها

الأستاذ الدكتور

محمد عبد السلام

أستاذ النساء والتوليد
كلية طب بنها



١٩٨٦