

المختصر العربي

الملخص العربي

يؤدي تفاعل tall مع أغشية الغسيل تغيير مكونات المختلفة حدة التوافق

ويهدف البحث -رأسية مستوى ك- من كين ميكروجلوبولين في
مصل الدم في مرض الفشل الكلوي المزمن اللذين تجرى
يهدف ب إلى إلقاء الضوء على دور هذه كدلالات على الحيوى
الكلوى المختلفة.

اشتملت ثلاثون مريضاً يعانون من الفشل
المنتظم LS اشتملت Tab رأسية على عشرة أفر أصحاب ضابذة تم
ثلاثة e فى المجموعة الأولى
clue اكريليونيتزل $1i$ ستخدمت غشاء البولى سلفون غشاء الكوبروفان

وقد JAL el لكل للمرضى كما أجريت لهم الفحوص التالية:

- صور S الدم وأثناء الغسيل
- مستوى "بويند" و"كر"تينين وبعد الدموى
- مستوى الأنترلوكين وبعد
- مستوى "ت" تا γ ميكروجلوبولين قبل و- γ الغسيل "وى

وقد الدراسة أن مستوى AND كين 1 والبيتا ٢ ميكروجلوبولين بزاد
احصائية ند مقار هذه أك فى

البيضاء J^v بدرجة ١٠٠ Jean "جوى ولكن cab J12

خلال **hip** من كما أن الغسيل الصفائح بدرجة ذات دلالة
احصائية تبر owl من الأغشية عدد خلايا
لادم البيضاء الصفائح

يمكننا القول بأن فى كين و"يتا ميكروجلوبولين

إنخفاض خلايا x111 البيضاء والاكثر حدوث لتفاعلات مع
الكوبر (P_i) ولهذا يمكن هذه التغيرات J\$ على ان عدم التوافق الحيوى يحدث Si ثم مع هذا
الغشاء

— الله الرحمن الرحيم

g علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله

عليك عظيمًا

صدق الله العظيم

مستوى الانتز لوكين وا ٢ ميكروجلوبين اثناء علمية الفد

فى مرضى الفشل الكلوى نرمن

الاغشية المستعملة فى الفسيل عليها

مقدمة

141; جزئيا لشروء ' ' مول ' 'ى در"

الماجستير

الاكا

من

الطبية / عزة كمال احمد القاضى

على الهندى

أستاذ الباثولوجيا

I. د. محمد شوقى السيد

Sip Jot- . استاذ

د. أيناس السيد الشعراوى

استاذ الباثولوجيا

الاكليينكية

كلية طب بنها

جامعة الزقازيق

١٩٩٦

