

المخلص العربي

يعتقد الكثير من الاباء والامهات ان الطفل لابد ان تظهر لــــه
الاسنان اللبنية خلال الشهر السادس او السابع من العمر .

هذه الدراسة اجريت لمعرفة مدى انتشار واسباب تأخر بزوغ الاسنان
عند الاطفال فى العيادة الخارجية لمستشفى باب الشعرية الجامعى .

ولكى نجري هذه الدراسة فقد اخترنا يومين من كل اسبوع لمدة اربعة
شهور من الشتاء (من ١٢/١/١٩٨٠ حتى ٣٠/٣/١٩٨١) ولمدة
اربعة شهور من الصيف (من ١/٦/١٩٨١ حتى ٣٠/٩/١٩٨١) لكى
نسأل كل امهات الاطفال البالغين من العمر ٦ شهور حتى ٢٤ شهر
عن سبب شكوتهن . ولكى نوضح مدى اهمية تأخر بزوغ الاسنان من وجهة
نظر الامهات فقد قسمنا الحالات الى مجموعة اتت اساسا تشكو من عدم
ظهور الاسنان ، ومجموعة اخرى اتت تشكو من اى عرض اخر ، وعند
سؤال الام يتضح ان الطفل لم يظهر له اسنان لبنية حتى وقت الكشف .

وقد اخذ التاريخ المرضى وتم الكشف الشامل على جميع الحالات التى تعاني
من تأخر بزوغ الاسنان مع اجراء بعض التحاليل الكيميائية لبعض الحالات .
وقد قارنا نمو جميع الحالات مع التاريخ التطورى والكشف الشامل عليهم .

وشملت الدراسة ايضا محاولة لمعرفة سن بداية بزوغ الاسنان لدى
الاطفال المصريين الطبيعيين ، وقد تم ذلك عن طريق متابعة شهرية

لمائة طفل حتى ظهور اول سنة لبنية • كما تم سؤال جميع امهات
الاطفال المتأخرين فى بزوغ الاسنان عن سن بزوغ الاسنان الطبيعى لدى
الطفل • وعن اهم اسباب تأخر بزوغ الاسنان لدى الاطفال •

وفى خلال الثمانية أشهر تم سؤال ٢٢٧٣ أم لاطفال يبلغوا من العمر
من ٦ شهور ا حتى ٢٤ شهرا • اتضح ان من بينهم ٢١ حالة أتت تشكو
أساسا من تأخر بزوغ الاسنان بينما اتت ٢٩ حالة تشكو اعراض اخرى •
وعند الكشف اتضح ان الطفل لم يظهر له اسنان • وذلك يبلغ عدد الحالات
التي لم يظهر لها أسنان ٥٠ حالة بنسبة (٢٢ %) •

وفى خلال الصيف أتى ١٣٢٣ طفل اتضح ان ٢٤ حالة منهم تعانى
من تأخر بزوغ الاسنان بنسبة (١٨١ %) • أما خلال الشتاء فقد اتى ٩٥٠
طفل كان بينهم ٢٦ حالة تعانى من تأخر بزوغ الاسنان بنسبة (٢٧٤ %) •
كان الكساح هو اهم اسباب تأخر بزوغ الاسنان خلال الشتاء والسبب الثانى
خلال الصيف • بينما كانت امراض سوء التغذية اهم الاسباب خلال الصيف
والسبب الثالث خلال الشتاء • ثم اتت الاسباب الاخرى التى يمكن ان تكون
اسباب موضعية او اسباب عامة اكثر انتشار خلال الصيف عن الشتاء •

واتضح ايضا ان اغلب الاطفال الذين يعانون من تأخر بزوغ الاسنان كان
عمرهم من ١٢ شهر حتى ١٥ شهر (٤٢ حالة) • وقد تأثر بالمشكلة
الاناث اكثر من الذكور • ولوحظ ان لين العظام كان واضحا اكثر

بين الذكور ، ومن الناحية الاخرى كانت امراض سوء التغذية اكثر وضوحا
بين الاناث ، واخيرا كانت الاسباب الاخرى اكثر انتشارا بين الاناث .

واتضح من الدراسة ان متوسط السن لظهور اول سنة لبنية لدى
الاطفال الطبيعيين المصريين هو (١٤٦ ر ± ٩٤ ر) شهرا . وقالت
كل امهات الاطفال المرضى ان الطفل الطبيعي تظهر له اول سنة
لبنية عند الشهر السادس او السابع من العمر ، وقد قالت ١٦ أم ان سبب
تأخر بزوغ الاسنان هو الضعف العام وقالت ٢١ أم انهن لا يعلمن سبب
تأخر بزوغ الاسنان بينما قالت ١٣ أم ان هناك عوامل وراثية .