

الطبخ العربي

أجريت هذه الرسالة على عشرين مريضاً " ١٤ ذكر و ٦ اناث " يعانون من فشل

كلوى مزمن ويعالجون بالغسيل " الاستصفا " الدموى •

وقد أجرى لكل منهم الآتى : —

- ١ — فحص الكيمياء شاملاً •
- ٢ — نسبة البولينا بالدم قبل وبعد الغسيل الدموى •
- ٣ — نسبة الكرياتينين بالدم قبل وبعد الغسيل الدموى •
- ٤ — نسبة الهيماتين بالدم قبل وبعد الغسيل الدموى •
- ٥ — نسبة الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم بالدم قبل الغسيل وبعد بداية الغسيل
الدموى بساعتين وبعد الغسيل الدموى •
- ٦ — رسم القلب قبل الغسيل الدموى وبعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وبعد
الغسيل الدموى والتركيز على ما يلى : —

• مسافة ب — ر •

• مسافة موجات ك — ر — س •

• مسافة ك — ت المحسنة •

• مقطع س — ك •

وقد توصلنا الى النتائج الآتية : —

- ١ — انخفاض ملحوظ لنسبة البولينا والكرياتينين فى الدم بعد الغسيل الدموى •
- ٢ — زيادة طفيفة فى نسبة الهيماتين فى الدم بعد الغسيل الدموى •
- ٣ — انخفاض ملحوظ فى نسبة البوتاسيوم فى الدم فى الفترة قبل بداية الغسيل
مباشرة الى ما بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وفى الفترة قبل بداية
الغسيل مباشرة الى نهاية الغسيل الدموى • أما فى الفترة بعد بداية الغسيل
الدموى بساعتين وحتى نهاية الغسيل الدموى فقد وجد انخفاض طفيف •

٤ - وجدت زيادة ملحوظة فى نسبة الصوديوم فى الدم فى الفترة قبل الغسيل الدموى مباشرة وحتى بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وفى الفترة من قبل الغسيل الدموى مباشرة وحتى نهاية الغسيل الدموى وفى الفترة من بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وحتى نهاية الغسيل الدموى •

٥ - وجدت زيادة طفيفة فى نسبة الكالسيوم فى الفترة من قبل بداية الغسيل مباشرة وحتى بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين أما فى الفترة من قبل بدايته الغسيل الدموى مباشرة وحتى نهاية الغسيل الدموى وكذلك فى الفترة من بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وحتى نهاية الغسيل الدموى فـوجدت زيادة ملحوظة •

٦ - مسافة ب - ر : -

وجدت زيادة طفيفة فى مسافة ب - ر فى الفترة من قبل بداية الغسيل الدموى مباشرة وحتى بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وكذلك فى الفترة من قبل بداية الغسيل الدموى مباشرة وحتى نهاية الغسيل الدموى وكذلك فى الفترة من بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وحتى نهاية الغسيل الدموى •

٧ - موجة ك - ر - س : -

وجدت زيادة طفيفة فى موجة ك - ر - س فى الفترة من قبل بداية الغسيل الدموى مباشرة وحتى بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وكذلك فى الفترة من قبل بداية الغسيل الدموى وحتى نهايته وكذلك فى الفترة من بعد بدايته الغسيل بساعتين وحتى نهايته •

٨ - مسافة ك - ت المصححة : -

وجدت زيادة ملحوظة فى مسافة ك - ت المصححة فى الفترة من قبل بدايته الغسيل الدموى مباشرة وحتى بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وكذلك فى الفترة من قبل بداية الغسيل الدموى وحتى نهاية الغسيل الدموى وكذلك فى الفترة من بعد بداية الغسيل الدموى بساعتين وحتى نهايته •

٩ - مقطع س-ت : -

وجد قصر طفيف في مقطع س-ت في الفترة من قبل بداية الغسيل الدموي مباشرة وحتى بداية الغسيل الدموي بساعتين وكذلك في الفترة من قبل بداية الغسيل وحتى نهايته وكذلك في الفترة من بعد بداية الغسيل الدموي بساعتين وحتى نهايته .

وطيه فمن النتائج السالفة الذكر يبدو أن التغيرات في نسبة المسودييوم والبروتاسيوم والكالسيوم في الدم قبل وبعد بداية الغسيل الدموي بساعتين وبعد نهاية الغسيل الدموي ليست الأسباب الكافية للتغيرات في مسافة ب-ر وموجة ك-ر-س-و مسافة ك-ت المصححة ومقطع س-ت قبل وبعد بداية الغسيل الدموي بساعتين وكذلك بعد نهاية الغسيل الدموي مباشرة .

ولذلك من الممكن أن يكون سبب هذه التغيرات في التوصيل الكهربائي للقلب في مرضى الفشل الكلوي الذين يعالجون بالغسيل الدموي سموم البولينا الغير معروفة أو تأثير عضلة القلب بالبولينيسا .



التغذية في التوصل الكوراني للقلب في مرضي الفشل
الكلى المزمن الذين يعانون بدانة الدم المسببة

رسالة مقدمة من

الطبيب / السيد عبد الخالق محمود الدركسي

توطئة للحصول على درجة الماجستير

في

أمراض القلب

تحت إشراف

أ. د. د. / محمد أحمد مصطفى

أستاذ الأمراض الباطنة وعيد كلية طب بنها

أ. د. د. / عقيل عبد العظيم حفي

أستاذ ورئيس قسم الأمراض الباطنة كلية طب بنها

الدكتور / المتولي لطفى الشهابي

مدرس الأمراض الباطنة والعشرون وحدة الكلى

المناحة - كلية طب بنها

كلية طب بنها .. جامعة الزقازيق

١٩٨٨ م

