

ARABIC SUMMARY

بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص البحث باللغة العربية

من المتفق عليه أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من خطر النزلات المعوية ، ويتم هذا من خلال عدة عوامل متواجدة في لبن الأم ، أهمها الجسم المضاد المفرز " أ " وقد أجريت هذه الدراسة لتحديد معالم الفوارق بين الأطفال الذين يرضعون لبن الأم وأولئك الذين يعتمدون على التغذية الصناعية من حيث مدى انتشار مرض الاسهال وكذلك حدته بينهم وعدد مرات حدوثه .

تم عمل دراسة مقارنة على مجموعتين من الأطفال من أعمار وبيئات اجتماعية واقتصادية متناظرة . وقد اشتملت كل مجموعة على خمسمائة طفل . وقد أسفرت الدراسة عن :

أولا : وجد أن نسبة حدوث الاسهال في الأطفال الذين يرضعون لبنا صناعيا والتي بلغت ٤٨٢٪ أعلى من مثيلتها بالنسبة للأطفال الذين يرضعون لبن الأم والتي بلغت ٣٤٨٪ .

ثانيا : لوحظ أن عدد مرات حدوث الاسهال وأيضا درجة الجفاف تكوّن أشد وطأة في حالات الرضاعة الصناعية عنه في حالات الرضاعة الطبيعية .

ثالثا : هناك تباين واضح في مدى انتشار عدم تحمل سكر اللاكتوز بين المجموعتين ، حيث ازدادت نسبته في الأطفال الذين يرضعون صناعيا . في نفس الوقت وجد أن معدل انتشار عدم تحمل سكر اللاكتوز ازداد اضطرابيا مع تكرار مرات حدوث الاسهال .

رابعاً : وجد عدد قليل من كرات الدم البيضاء فى براز ثلثى
حالات المجموعتين تقريباً ، بينما ازداد وجودها فى
الثلث الباقي .

....