

ملخص عربي

يعتبر البروتين الشحمي (الدهني) (أ) مركب ذو جزيئات كبيرة الحجم ويوجد في البلازما البشرية ويتكون من بروتين شحمي منخفض الكثافة، وجزئ بروتين (أ) ولقد أوضحت دراسات عديدة أن ارتفاع نسبة البروتين الشحمي (أ) بالبلازما يصاحبه أمراض قصور الدورة الدموية التاجية.

فقد أثبتت الدراسات وجوده في العينات المأخوذة من الشرايين المتصلبة واكتشف وجود تشابه في التركيب الكيميائي بينه وبين بروتين التخثر الدموي (البلازمينوجين) مما يجعله يلعب دوراً هاماً في عملية التصلب وتكوين الجلطات داخل الشريان التاجي ، وثبت وجوده بكم أكبر في العينات المأخوذة من شرايين مرضى الذبحة الصدرية غير المستقرة عنه في مرضى الذبحة الصدرية المستقرة.

ونحن في هذه الرسالة نبحث مدى المطابقة بين مستواه في دم هؤلاء

المرضى والصور الاكلينيكية والقسطة التشخيصية لهم .

المطابقة بين مستوى البروتين الدهني (أ) والصورة الإكلينيكية والقسطرة التاجية في مرضى قصور الشريان التاجي

رسالة مقدمة من الطبيب/

مجدى فرج محمد حسين

بكالوريوس الطب والجراحة

توطئة للحصول على درجة الماجستير في أمراض

القلب والأوعية الدموية

تحت إشراف

أ.د/ السيد عبد الخالق

أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية

كلية طب بنها

د/ إبراهيم منصور

مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية

كلية طب بنها

د/ متولى العمرى

مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية

كلية طب بنها



د/ محمد وجدى

استشارى مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية

بمعهد القلب القومى

كلية طب بنها - جامعة الزقازيق