

دراسة هستيولوجية لعقد ذيل البربخ في حالات المقم الانسدادي

أجريت هذه الدراسة على سبعة وعشرين مريضاً بالمقم من مرضى مستشفى قصر المهنسي في الفترة من سبتمبر ١٩٧٨ حتى يناير ١٩٧٩ تحت التشخيص (مقم انسدادى) مع وجود عقدة في ذيل البربخ .

عند دخول المرضى المستشفى تم اجراء فحص الكليتيكى كامل يتضمن تاريخ المرض مع فحص عام وموضى ، وقد أجريت على هؤلاء المرضى مختلف الفحوصات الاخرى مثل تحليل البول - تحليل افراز البروستاتا - تحليل السائل المنوى .

وقد تم أخذ عينه من العقدة الموجودة في ذيل للبربخ أثناء اجراء عملية توصيل للبربخ بالجبل المنوى .

وقد تمت دراسة هستيولوجية لهذه العقد ، ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة كما يلى :

التهاب مزمن غير نوعى بدون تليف في احدى عشرة حالة (٤٠,٧%) - التهاب مزمن غير نوعى مع تليف في حالتين (٢,٤%) - تليف في ستة حالات (٢٢,٢%) - ورم منسوى حبيبي Sperm granulomas في ثلاثة حالات (١١,١%) - التهاب ناتج عن الاصابة بالبلهارسيا في حالة واحدة (٣,٧%) - التهاب درني في حالة واحدة (٣,٧%) - ورم خلقي (Teratoma) في حالة واحدة (٣,٧%) - انتفاخ في أنبوبة البربخ بدون التهابات في حالتين (٢,٤%) .

ونخلص من هذه الدراسة الى أن الالتهاب الغير نوعى للبربخ هو أهم أسباب انسداد قناة البربخ المؤدى الى المقم في الرجال .

وهكذا فان التشخيص المبكر والملاج الافضل لحالات التهاب الخصية والبربخ الغير نوعى قد يؤدى الى تقليل الاصابة بالمقم عند الرجال .