

ARABIC SUMMARY

ملخص

يحتوي مرضى زيادة تفرن باطن القدمين واليدين من الأمراض الجلدية الشائعة ، ذات الأشكال المتعددة والناتجة عن أسباب مختلفة .

وهذا المرض إما أن يكون وراثيا منفردا أو مع مرض آخر وإما أن يكون ، تسببا ويحدث مع مرض جلدي آخر .

وقد تم دراسة ٢٠٠ حالة دراسة اكلينيكية يمثلوا الأشكال المختلفة لهذا المرض وقد جمعت هذه الحالات من العيادة الخارجية للأمراض الجلدية في كلية طب عين شمس ومن مستشفى القاهرة التناسلية (ابن البرصود) في المدة بين أول فبراير ١٩٨١ حتى نهاية يوليو ١٩٨٠ .

وقد تم أيضا دراسة ٥٠ حالة مختاره دراسة باثولوجيا للتأكد من الاخصى الاكلينيكي .

وأظهر البحث النتائج التالية :

نسبة الإصابة في هذا المرض في الأمراض المختلفة كالآتي :

% ٣٦,٥		* صدفة القدمين واليدين تشل أعلى نسبة
% ٣٠		* الأكثرية المزمنة لليدين والقدمين
% ١٠,٥		* تأليل القدمين
% ٨,٥		* النخالة الشعرية الحمراء
% ٥		* الحالات الوراثية

% ٥		* الكلى
% ١,٥		* مرض ديار
% ١		* الفطر المزمن
		* زيادة تفرغ باطن القدمين نتيجة انسداد الاوعية
% ١		* الليفاوس
% ١		* حزاز القدمين واليدين

الذي قابل للحدوث في أي عمر منذ الولادة او الاشهر الاولى فـ
 الـ يـا مـنـصـا فـي الحـالـات الـرـاثـيـة وحتـى سن الخمسين وخاصة فـي
 لـات الصـدفيـة :

- في ١٢ حالة (٤٨,٥ %) كان القدمين واليدين مصابون معا
- في ٤٦ حالة (٢٣ %) كان اليدين فقط مصابان
- في ٥٧ حالة (٢٨,٥ %) كان القدمين فقط مصابان

ا. اية الظواهر ظهرت في حوالي ٨٨ حالة (٤٤ %) كالآتي :

- ٧٣ حالة صدفية
- ١٠ حالات اكزيما مزمنة
- ٥ حالات نخاله الشعرية حراء