

ملخص باللغة العربية

ان زيادة الشعر في جسم المرأة من الحالات الصعبة التي يتعامل معها الطبيب .
وقد يكون الشعر زائدا في الأماكن الطبيعية والغير طبيعية في جسم الانثى او يكون له شكل شعر الرجل . ويمكن تقسيمه الى درجات متفاوتة بين شعر ذكرى بسيط الى انثى مشعرة كاملة . وتختلف نسبة المرن من منطقة لاخرى فبينما تكون عالية في منطقة البحر الابيض المتوسط تكون منخفضة في اليابان . ويرجع سبب المرن عموما الى زيادة الهرمون الذكرى الذي يكون مصدره الغدة الكظرية او المبايض او الاثنان معا . وبالرغم من ذلك توجد حالات يكون سببها استعمال الادوية النارجية .

تشخيص المرض يحتاج الى فحص اكلينكى للانثى مع اختبار للهرمونات .
فبينما يمرض يكون لهم شعر بسيط على الوجه ، الاخرون يكون لهم ذقن وشعر سبب بالاضافة الى وجود شعر على الصدر والبطن والاطراف . عند قياس الهرمونات يكون معدل الهرمون الذكرى الحر في البلازما في الانثى المريضة مرتفعا حتى ولو كان الهرمون الذكرى كله طبيعيا ويكون معدل الهرمون - ٣ الفا اندرو ستانديول مرتفعا حتى في وجود معدلات طبيعية للهرمونات الذكرية الاخرى . حديثا وجدت علاقة قوية بين تركيز الهرمون الذكرى في اللعاب وتركيزه في البلازما ولذلك فان تركيزه في اللعاب استعمال في التشخيص .

بالنسبة للعلاج استعملت منادات الهرمون الذكرى بنجاح . ديكساميثازون -
استعمل بجرعة ٢ / ١ مجم في اليوم وكانت هناك اضرار جانبية من زيادة الجرعة المستعملة لفترة طويلة . . .

• حبوب منع الحمل استعملت أيضا لمدة لا تقل عن ٦ اشهر وحوالى ٦٠ / ٠ .
من الحالات التى عولجت لاحظوا نقص فى معدل نمو الشعر وفى كمية الشعر
فى الوجه .

• استيات السيوبرتسرون استعملت بجرعة ١٠٠ مجم فى اليوم لمدة تتراوح بين
٦ الى ١٢ شهر وكانت معدلات الاستجابة ما بين ٥٨ / ٠ ٠ ٧٠ / ٠ ولكن
هذا الدواء عندما استعمل مع حبوب منع الحمل بجرعة ١٠٠ مجم — من
هذا الدواء ابتداء من اليوم الخامس الى اليوم الرابع عشر من الدورة ٥٠ ٥٠ مجم
من ايشنيل ايستراديول ابتداء من اليوم الخامس الى اليوم الخامس والعشرين
من الدورة اعطى تحسن واضح مع وجود ضرارين جانبين اساسيين فقط هما
زيادة الوزن والشعور بالتعب .

• اخيرا سيبرونولاكتون ادخل فى العلاج بجرعة من ٥٠ الى ١٠٠ مجم فى اليوم
لمدة ٦ اشهر وكانت النتيجة تاشد واضح على كمية وخاصة الشعر فى الوجه
فى معظم الحالات التى عولجت تقريبا بدون اى ضرر جانبى ملحوظ باستثناء
زيادة التبول فى الايام الاولى القليلة من العلاج ولهذا يعتبر افضل
عامل مؤثر وامان فى العلاج .

• بجانب مضادات الهرمون الذكري ، استعملت ايضا عمليات الحلاقة او إزالة
الشعر الزائد .

(٩)

١٥

الشعر الزائد في جسم المرأة



رسالة مقدمة من



الطبيب / محمد امين عبد المنعم علي

قسم الامراض الجلدية والتناسلية

كلية طب بنها

9

لنيل

٨
٢٠٠٦

درجة الماجستير في الامراض الجلدية والتناسلية

تحت اشراف

الدكتور / علو عليان خلف الله
استاذ امراض النساء والتوليد المساعد
كلية الطب - جامعة عين شمس

الدكتور / حسين صبحي المقدم
استاذ مساعد ورئيس قسم الامراض الجلدية والتناسلية
كلية طب بنها - جامعة الزقازيق

(١٩٨٤)