

ARABIC SUMMARY

ان هدف هذه الدراسة هو القاء الضوء على نمط الأمراض في قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي في دراسة مستقبلية واستيعادية، وشملت الدراسة الاستيعادية مرضى القسم الداخلى في الفترة من يناير سنة ١٩٨٥ وحتى يونيو سنة ١٩٨٦ وأخذت من تذاكر المستشفى، أما الدراسة المستقبلية فشملت جزئين الأول من العيادة الخارجية للأطفال بالمستشفى في الفترة من يوليو سنة ١٩٨٦ وحتى يونيو سنة ١٩٨٧ والثاني مرضى القسم الداخلى في نفس الفترة السابقة وايضا تم الحصول عليها من واقع تذاكر المستشفى.

فيما يخص الدراسة المستقبلية فلقد كان عدد الحالات التي تم فحصها بالعيادة الخارجية ٣٠٠٣ حالة ، وهذا العدد يمثل عينه عشوائية من بين الذين حضروا للعيادة الخارجية وكان عدد الأطفال الذكور أكبر من الإناث ولقد تم تقسيم العينة الى ٤ مجموعات الأولى للأطفال أقل من سنة ، والثانية للأطفال بين سنة وستين ، والثالثة للأطفال من ستين الى ٦ سنوات ، والرابعة للأطفال أكثر من ٦ سنوات في المجموعة الأولى وجد أن اصابات الجهاز التنفسي تحتل المرتبة الأولى يليها أمراض الجهاز الهضمي ثم أمراض التغذية ، وفي المجموعة الثانية احتلت أمراض الجهاز الهضمي المرتبة الأولى ثم أمراض الجهاز التنفسي ، وفي المجموعة الثالثة أتت أمراض الجهاز التنفسي في المرتبة الأولى ثم الأصابات الطفيلية ، وفي المجموعة الرابعة أتت أيضا أمراض الجهاز التنفسي أولا ثم الأصابات الطفيلية ثم أمراض الكلى وأمراض الجهاز الدوري. ولقد وجد أن أمراض الجهاز التنفسي والنزلات المعوية - وهي من أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعا - قد انتشرا سويا في الصيف والشتاء بنفس الدرجة ، وكانت غالبية الأمراض التي شوهدت في العيادة الخارجية أمراضا بسيطة وهذا يمكن تعزيتة الى أن معظم الأمراض صعبه العلاج تكون محولة من مستشفيات أخرى أو عيادات خاصة للقسم الداخلى بالمستشفى دون المرور بالعيادة الخارجية وكانت النزلات المعوية هي أكثر الأمراض شيوعا في المجموعتين الأولى والثانية بينما احتلت النزلات الشعبية والتهابات اللوزتين المكانة الأولى بين الأمراض في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وبخصوص أمراض القسم الداخلى في الفترة من يناير سنة ١٩٨٥ وحتى يونيو ١٩٨٦ فلقد كان عدد حالات الدخول في هذه الفترة ٣٥٠ حالة بالمقارنة ب ٢٢٧ حالة أدخلت في الفترة من يوليو سنة ١٩٨٦ وحتى يونيو سنة ١٩٨٧ . وقد أخذ مرض الهزال الناتج من سوء التغذية أعلى نسبة دخول بين أمراض المجموعة الأولى وبعبء حالات النزلات المعوية . وفي المجموعة الثانية جاء الهزال في المكانة الأولى وبعبء الالتهابات الرئوية .

وجاء الهزال أولا أيضا في المجموعة الثالثة وبعبء حالات تضخم الكبد والطحال ثم التهابات الرئة . وفي المجموعة الرابعة جاء أولا التهاب المفاصل الروماتزمي ثم الالتهابات

الربوئية . ولقد سجلت أمراض الجهاز الدوري أعلى نسبة بقاء بالمستشفى . كذلك تـم خروج ٢ ر ٧٦ ٪ من الحالات في تحسن بينما توفي ٩٥ ٪ من الحالات وفي الفترة من يوليو سنة ١٩٨٦ وحتى يونيو سنة ١٩٨٧ أدخلت للمستشفى ٢٢٧ حالة . وكانت النـزلات المعوية أكثر أمراض المجموعتين الأولى والثانية شيوعا . وكانت الالتهابات الرئوية أكثر أمراض المجموعة الثالثة شيوعا وأخيرا جاءت أمراض الجهاز الدوري على قمة أمراض المجموعة الرابعة . وسجلت أمراض الحميات والعدوى أعلى نسبة مكوث بالمستشفى وتم خروج ٢ ر ٧٦ ٪ من الحالات في تحسن بينما هبطت نسبة الوفيات الى ٨ ر ٠ ٪ .

وقد أوضحت تقارير قسم الإحصاء بالمستشفى النتائج التالية :

تم ادخال ٤٦٩ حالة سنة ١٩٨٣ لقسم الاطفال ، وفي عام ١٩٨٤ أدخل ٦٩٦ حالة ، وفي عام ١٩٨٥ أدخل ٥٧٢ حالة ، وفي عام ١٩٨٦ أدخل ٢٩٢ حالة ، وكان معدل اشغال السرير في عام ١٩٨٣ - ١٠١ ٪ وفي عام ١٩٨٤ كان المعدل ٩٩ ٪ ثم ٩٥ ٪ في عام ١٩٨٥ ، وأخيرا بلغ ١٠٠ ٪ في عام ١٩٨٦ .

أما معدل التردد على السرير فلقد بلغ ٦٢ في عام ١٩٨٣ ، ١٥٧ في عام ١٩٨٤ ، ١٩١ في عام ١٩٨٥ ، ٣٧٥ في عام ١٩٨٦ وأخيرا أعطيت توصيات للارتقاء بمستوى الصحة العام وللنهوض بقدره المستشفى .