

Arabic summary

الملخص العربي

الفتق المنزلق خلال فتحة المرئ أو الفتق جار المرئ أو خليط من النوعين السابقين يحدث عند إتصال المرئ بالجزء العلوى من المعدة حيث يسبب ضعف فى الصمام ويتسبب فى صعود الجزء العلوى من المعدة خلال الحجاب الحاجز الى أسفل الصدر وهذا يسبب زيادة فى الضغط فى محتويات المعدة والمرئ ويسبب الإرتجاع من أسفل.

يتميز فتق الحجاب الحاجز سواء المنزلق أو جاز المرئ بعدم وجود أعراض فى معظم الحالات إلا إذا صاحب الفتق المنزلق نوع من التغلث (إرجاع الطعام).

فى مثل هذه الحالة من المعتاد أن يشكو المريض من حركة الجوف تجشؤ ، الإحساس بالامتلاء و غثيان وقد يتطور الأمر الى ما يدل على ظهور مضاعفات مثل صعوبة فى البلع أو فى دموى وغيرها .

ولتشخيص فتق الحجاب الحاجز يجب على الطبيب أن يتوقعه ويبحث عنه فى الحالات التى تكون بها الأعراض السابقة ومن الفحوص اللازمة لتشخيص فتق الحجاب الحاجز أشعة على الصدر جانبية وأمامية ، أشعة على الجهاز الهضمى باستخدام صبغة مناسبة ، فحص بالأشعة المقطعية بالكمبيوتر ، عمل وظائف مرئ وفحص بمنظار المرئ والمعدة.

ويختلف علاج فتق الحجاب الحاجز حسب نوعه فبعض الأنواع لا تعالج إلا جراحيا مثل فتق جدار المرئ ومنه ما يمكن محاولة علاجه بالعقاقير وبعض التغيير في طرق التغذية حتى تقل إفرازات المعدة ويقل الإرتجاع الى المرئ مثل حالات الفتق المنزلق.

وحديثا توجد خطوط حديثة للعلاج تشمل إجراء الجراحة عن طريق منظار البطن الجراحى ويتميز منظار البطن الجراحى بتحسين الحالات بعد إجراء العملية وعدم الحاجة إلى إستخدام الأدوية ولا يحتاج الجراح إلى عمل فتح كبير ويمكن المريض فترة قصيرة بالمستشفى ويتم شفاؤه سريعا بالمقارنة بالجراحة العادية كذلك تقل كثيرا نسبة حدوث مضاعفات بعد إجراء العملية لذلك يعتبر منظار البطن الجراحى من أفضل العمليات التى تجرى فى حالات فتق الحجاب الحاجز.