

الملخص العربي

إن النتائج الجيدة لإستئصال المراره بالمنظار هي التي شجعت الجراحين لإدخال منظار البطن الجراحي في علاج قرحة الإثني عشر المزمنة .

اجري هذا البحث على ٤٢ مريض من مرضى قرحة الإثني عشر المزمنة والذي تقرر لهم إجراء عملية إستئصال العصب الحائر بواسطة منظار البطن الجراحي .

كان متوسط الوقت لإجراء هذه العملية ١٠١ دقيقة . ولقد تم فتح مريض واحد فقط نتيجة إلتصاقات حول المرئ .

لم توجد صعوبات اثناء إجراء عملية إستئصال العصب الحائر بواسطة منظار البطن الجراحي . ولقد كان الألم بعد هذه العملية متحمل وكانت الأمعاء تعود الى حركتها الطبيعية خلال ٢٤ ساعة بعد العملية .

ولقد إستخلص الباحث أن إجراء عملية إستئصال العصب الحائر بواسطة منظار البطن الجراحي تعتبر عملية ذات فوائد متعددة منها أنها عملية سهلة وسريعه وذات نفس نتائج إستئصال العصب الحائر عن طريق فتح البطن , كما أنها تعيد المريض الى عمله ونشاطه الطبيعي بسرعه .