

بسم الله الرحمن الرحيم أورام الأمعاء الدقيقة

تمثل الأمعاء الدقيقة حوالي ٧٥% من طول القناة الهضمية، ونسبة أكثر من ٩٠% من مساحة السطح الكلية لها، وبالرغم من ذلك فإن أورام الأمعاء الدقيقة تمثل نسبة ١-٤% من أورام القناة الهضمية، بينما تصل نسبة الأورام السرطانية لأقل من ١% . ويرجع ذلك إلى عدة عوام منها :-

- ١- الوسط القلوي للأمعاء الدقيقة .
- ٢- سرعة إنتقال محتوياتها آلي القولون، وذلك ناتج عن سيولة محتوياتها، مما لا يعطى فرصة لأى مواد مسببة للسرطان أن تؤثر على الأمعاء إذا اتصلت بها لفترة طويلة .
- ٣- التجديد المستمر للنسيج الطلائى .
- ٤- قلة البكتيريا المسببة للسرطان فى الأمعاء الدقيقة.
- ٥- تضوج الجهاز المناعى بالأمعاء الدقيقة.

تنقسم أورام الأمعاء الدقيقة إلي:-

- ١- أورام حميدة
 - ٢- أورام خبيثة (أورام أولية و أخرى ثانوية).
 - ٣- أورام الغدد الصماء (أورام " كارسينويد").
- وأورام الأمعاء الدقيقة أكثر حدوثا فى الذكور عنها فى الإناث، والمتوسط العمرى لحدوثها هو بين ٥٠ و ٦٠ عاما.
- وبرغم ضالة الإثنى عشر بالنسبة للطول الكلى للأمعاء الدقيقة إلا أن نسبة حدوث الأورام به أعلى من بقية الأمعاء الدقيقة نسبيا.

وأعراض هذه الأورام غير مميزة لها ومن أهمها :-

- ١- آلام بالبطن.
 - ٢- ورم بالبطن.
 - ٣- نزيف شرجي.
 - ٤- نقصان الوزن.
 - ٥- أعراض الانسداد المعوي.
 - ٧- وأعراض الالتهاب البريتوني.
- وبوجه عام فإن الأورام الخبيثة تسبب أعراض مبكرة عن الأورام الحميدة

الأبحاث المستخدمة في علاج أورام الأمعاء الدقيقة :-

- الأشعة السينية: كالأشعة باستخدام الباريوم، وهى من أهم الوسائل للتشخيص.
- أشعة الموجات فوق الصوتية
- الأشعة المقطعية بالكمبيوتر على البطن
- الأشعة بالصبغة على شرايين الأحشاء
- الأشعة بالرنين المغناطيسى
- مناظير الجهاز الهضمي: تستخدم لتشخيص أورام الأمعاء الدقيقة ، وليس ذلك قاصرا على تشخيص الأورام بالإثنى عشر والجزء الأعلى من الصائم فقط، ولكن هناك مناظير حديثة تمكن الطبيب من فحص الأمعاء الدقيقة كلها، وإن كانت حتى الآن لم تستخدم على نطاق واسع.

علام أورام الأمعاء الدقيقة:

- ١- العلاج الجراحى: وهو العلاج الأمثل والأمل الوحيد للشفاء التام.
- أورام الإثنى عشر الحميدة يمكن استئصالها بالنظار. أما الأورام الخبيثة فتحتاج لاستئصال الإثنى عشر والبنكرياس وتشریح الغدد الليمفاوية القريبة من الإثنى عشر .