




الملخص العربى

لقد أجرى البحث فى مستشفى بنها الجامعى ومستشفى المنصورة العام وأجرى البحث على ٣٠ مريض يعانون من مرض الصدفية ومجموعة ضابطة تتكون من ٢٠ شخص أصحاء .

كان متوسط أعمار المرضى 37.7 ± 13.4 سنة ومتوسط أعمار المجموعة الضابطة كان 37.2 ± 7.6 سنة.

حساب مؤشر شدة مرض الصدفية أقل من ٤٠ كان يوجد عند ٢٣ مريض وأكثر من ٤٠ يوجد فى ٧ مريض .

حساب مؤشر شدة مرضى الصدفية أقل من ٤٠ كانت مدة المرض 2.8 ± 2.8 سنة وفى حساب أكثر من ٤٠ كانت مدة المرض 8.1 ± 7.3 سنة وذلك الفرق كان ذات دلالة احصائية ذو أهمية .

إن مستوى متقبل انترلوكين-٢- المذاب فى مصل الدم لمرضى الصدفية كان 1247.9 ± 867.8 وحدة / مللى وكان فى المجموعة الضابطة 111.9 ± 32.4 وحدة/مللى والفرق بين المجموعتين كان ذات دلالة احصائية ذو أهمية .

إن مستوى متقبل انترلوكين-٢- المذاب فى مصل الدم لمرضى الصدفية مع حساب مؤشر شدة مرض الصدفية أقل من ٤٠ كان 887.8 ± 411.7 وحدة/مللى وأكثر من ٤٠ كان 2298.7 ± 1193.7 وحدة/مللى وذلك الفرق كان ذو دلالة احصائية ذات أهمية.

تقدير علاقة إحصائية ذات دلالة إحصائية ذو أهمية بين فترة المرضي والمستوى

متقبل انظر لركن - ٢ - المذاب في مصل الدم ووجد أيضا علاقة إحصائية ذات دلالة

إحصائية ذو أهمية بين حساب مؤشر شدة مرض الصدفية وفترة المرض

إحصائية ذو أهمية بين حساب مؤشر شدة مرض الصدفية وفترة المرض
١ - إحصائية ذو أهمية بين حساب مؤشر شدة مرض الصدفية وفترة المرض
٢ - إحصائية ذو أهمية بين حساب مؤشر شدة مرض الصدفية وفترة المرض

لقد وجد علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية ذو أهمية بين فترة المرضي ومستوى
متقبل انترلوكين -٢- المذاب في مصل الدم ووجد أيضا علاقة ايجابية ذات دلالة
احصائية ذو أهمية بين حساب مؤشر شدة مرض الصدفية وفترة المرض.

كما وجد علاقة ايجابية ذات دلالة احصائية ذو أهمية بين مستوى متقبل
انترلوكين-٢- المذاب في مصل الدم لمرضى الصدفية وحساب مؤشر شدة مرض
الصدفية عندهم. أن الخلايا الليمفاوية (ت) ذو العلامة (س د ٣) كان وجودها واضحا
بين الخلايا الليمفاوية في الجزء الأعلى من الأدمة والجزء الأعرق في البشرة. أيضا
الخلايا الليمفاوية (ت) ذو العلامة (س د ٤) كان وجودها واضحا بين الخلايا الليمفاوية
في الجزء الأعلى من الأدمة والجزء الأعرق في البشرة ولكن الخلايا الليمفاوية تى ذو
العلاقة (س د ٨) كانت قليلة بين الخلايا الليمفاوية في الأدمة والبشرة.

من هذه الدراسة نستنتج الاتي:-

- ١- إرتفاع مستوى " متقبل انترلوكين ٢ المذاب" في مصل الدم يمثل عامل كبير
كدليل لنشاط الخلايا الليمفاوية في مرضى الصدفية .
- ٢- أن مستوى " متقبل انترلوكين ٢ المذاب" في مصل الدم له علاقة ايجابية مع شدة
مرضى الصدفية ولذلك يكون له فائدة كبيرة لتعيين شدة مرض الصدفية .
- ٣- أن إرتشاح الخلايا الليمفاوية ونشاطها واضطراب وظيفتها يساهم في نشوء
المرض .
- ٤- لعلاج مرض الصدفية من الممكن أن نقترح استخدام الأدوية المثبطة للمناعة
للذى لديهم تأثير مثبت خاصة على وظيفة الخلايا الليمفاوية (ت) ذو العلامة (س د
٤) خاصة على انتاج انترلوكين-٢- كالأجسام المضادة للخلايا الليمفاوية (ت) ذو
العلامة (س د ٤) أو استخدام عقار سيكلوسبورين .
- ٥- نقترح عمل أبحاث في المستقبل لتعيين الحافز المنبه لتنشيط الخلايا الليمفاوية تى
في مرض الصدفية.