

ARABIC SUMMARY

(الطغص العريسي)

يحدث التهاب حشفة القضيب في الرجال غير المختتمين ويظهر الالتهاب في صورة حادة أو مزمنة ويكون سببه إما الاحتكاك أو الإصابة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية وكذلك يمكن أن يحدث مع بعض الأمراض العامة . وإصابة حشفة القضيب بالبكتريا تكون غير محددة أو محددة . الإصابة غير المحددة يكون سببها نفس الغالب البكتريا السبحية أو العنقودية والذات مع النوع (B) أما النسل المحدد فيحدث نتيجة للإصابة بالزهرى أو السيلان ويكون المريض محتاجا إلى مزرعة حساسية لهذا لجة السبب الأساسي .

أما التهاب حشفة القضيب الفيروسي فيكون سببه فيروس هيريس من النوع الأول والثاني ومن الممكن أن يحدث معه التهاب بكتيري مما يجعل الحالة أكثر سوءا ويحتاج التشخيص إلى فحص عينة نسجية ومزرعة وهذا النوع له كثير من المضاعفات .

من الممكن أن تكون الإصابة بفطر الكانديدا والذات في الموضى بأعراض مزمنة وتعالج الحالة بمضادات الفطريات .

ومن أهم أسباب التهاب حشفة القضيب هو الإصابة بالتريكومونس التي تنتقل في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي وعند : شخص الحالة يجب ملاحظة الميكروب المسبب للحالة بالميكروسكوب . أما النوع الذي يسببه الأميبا فهو من الأنواع النادرة ويحدث في الغالب في الشواذ جنسيا .

ومن الممكن أن يحدث التهاب حشفة القضيب نتيجة للحساسية لبعض الأدوية ويعتبر مركبات التتراسيكلين من أشهر هذه الأدوية ويجب أن يفرق هذا النوع عن الأنواع المشابهة .

وكذلك يعتبر الاحتكاك والإصابات السطحية من أهم أسباب التهاب حشفة القضيب . أما الأنواع المزمنة لالتهاب حشفة القضيب فهي كثيرة وأهمها :

التهاب الحشفة الجاف ، التهاب الحشفة من نوع زون ، التهاب الحشفة المشرشر ،
والتهاب شبه السرطاني ، التهاب القرنى ، والتهاب المصحوب بالفرغينة .
النوع الأول (التهاب الحشفة الجاف) لا يعرف له سبب وليس له أغراض ويشفى من ذاته
ويحتاج لتشخيصه الى فحص النسيج ومن الممكن أن يتحول الى احد السرطانات
أما النوع الثانى (التهاب الحشفة من نوع زون) فليس من المعروف له سبب ويعتبر من
الاصابات قبل السرطانية ويحتاج الى فحص نسيجي وعلاجه الوحيد هو الختان .
أما النوع الثالث (التهاب الحشفة المشرشر) فيوجد فى صورتين الأولى تحدث مسرع
مرض رستر غير المعروف سببه ولا كيفية حدوثه . أما النوع الثانى فيتكرر حدوثه لمدة
طويلة . أما النوع الرابع (التهاب شبه السرطاني) فهو من الأمراض النادرة
ويتقدم بخطى حسيمة فى النمو ولا يعرف له سبب ويجب أن يفرق عن سرطان
الخلية الحرشفية وعلاجه الوحيد الناجح هو بستر الحشفة . أما النوع الخامس
(التهاب المصحوب بالفرغينة) فيعتبر احدى الضاعفات لبعض الأمراض التناسلية
لذلك يجب معالجة السبب الرئيسى .

وأغلب هذه الأنواع من التهابات حشفة القضيب غير معروف سببها وتحتاج الى
فحص نسيجي لتشخيصها وتختلف طرق علاجها -- فمنها ما يشفى بدون علاج
ومنها ما يشفى بالختان وقد تتطور بعضها الى أورام سرطانية قد يؤدى الى
بستر الحشفة .



التهاب حشفة القضيب

بحث مقدم

للحصول على درجة الماجستير في الأمراض الجلدية والتناسلية

مقدم من

الطبيب / مسعود حنا رياض

بكالوريوس الطب والجراحة

تحت إشراف

د. د. د. محمود الهادي


أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية

كلية طب بنها

د. د. د. محمد قسار

مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية

كلية طب بنها



١٩٨٢