

ARABIC SUMMARY

بسم الله الرحمن الرحيم

الملخص العربى

تقييم الدورة البابية قبل وبعد عمليات استئصال الطحال
(دراسة اكلينيكية موجات فوق صوتية وأشعة ملونه)

تجرى عمليات استئصال الطحال لعلاج نزيف دوالى المرء فى مرضى ارتفاع ضغط الدم فى الدوره البابية فى المصابين بمرض كبدى مزمن . وقد لوحظ أن تجلط الوريد البابى يعقب اجراء هذه العملية فى مثل هؤلاء المرضى .

ولقد تمت دراسة الجهاز الوريدى البابى فى هؤلاء المرضى قبل وبعد العملية بغرض اكتشاف معدل حدوث هذه المضاعفة . حيث تم اجراء استقصاءات معملية وفحص اكلينيكى لكل هؤلاء المرضى (٣٠) مريض بالإضافة لعمل فحص بالموجات فوق الصوتيه على البطن . وكذلك أجرى رسم بابى شريانى عن طريق الشريان المصاريقى العلوى لثلاثة عشر مريضا منهم .

ولقد وجد أن معدل حدوث جلطة الوريد البابى هو ٢٥.٨% وهو معدل عالى .

تجلط الوريد البابى هو أحد مضاعفات تليف الكبد فى المرضى منهم الذين تجرى لهم عمليات استئصال للطحال . وهو من المضاعفات التى يصعب تشخيصها اكلينيكيًا ولابد من البحث عنها بالموجات فوق الصوتيه أو برسم الاوعية .

ربما يكون سبب حدوث هذه المضاعفة هو الركود الحادث فى الجهاز البابى لأن المعطيات المعملية لم تظهر أى فرق ذو مغزى فى المرضى الذين أصيبوا بها . وهى قد تزيد من سوء حالة ارتفاع الضغط البابى لذلك فمن المهم البحث عنها فى هؤلاء المرضى .