

REFERENCES

Conference on the Geology of the Arab World, Cairo University, 333-344.

Abdelhamid, M. A. M. 1995. A study on some Cretaceous echinoids from Egypt. *Unpublished Ph.D. Thesis, Ain Shams University*, 400 pp.

Abdelhamid, M.A.M.1997. Turonian-Santonian echinoids from Wadi Sudr and Wadi Matulla, West Central Sinai, Egypt. *Middle East Research Center, Ain Shams University, Earth Science Series* 11, 136-158.

Abdelhamid, M. A. M. & El-Qot, G. M. E. 2001. Cenomanian-Santonian echinoids from Gabal El-Hamra and El-Minsherah, north and west Central Sinai, Egypt. *Middle East Research Center, Ain Shams University, Earth Science Series* 15, 1-20.

Abdelhamid, M. A. M. & El-Qot, G. M. E. 2002. Some Upper Cretaceous bivalves from Gabal El-Minsherah and Gabal El-Hamra, north and west central Sinai, Egypt. *Egyptian Journal of Paleontology* 2, 259- 288.

Abed, M. M. 1970. Biostratigraphical studies in the southern region of the Libyan Desert, Egypt. *Unpublished Ph.D. Thesis, Ain Shams University*, 387 pp.

Abed, M. M., Ayyad, S. N. & Abu-Zied, R. 1996. Stratigraphic classification of Triassic-Cretaceous rocks of Gebel Arif El-Naga, northeastern Sinai, Egypt. *Newsletters on Stratigraphy* 33/3, 117-131.

Abu Khadrah, A. M., Youssef, E. A. A. & Refaat, A. 1990. Depositional environments and diagenesis of the Matulla Formation, Abu Zenima area, west Central Sinai, Egypt. *Bulletin of Faculty of Science, Cairo University* 58, 493-513.

Agassiz, L. & Desor, E. 1846-1847. Catalogue raisonné des familles des genres et des espèces de la classe des Echinodermes. *Annales des Sciences Naturelles , Zoologie* 3/6-8.

Albanesi, C. & Busson, G. 1974. Gastéropodes du Crétacé Supérieur de

- l'extrême-sud tunisien et de la région du Tinrhert (Sahara Algérien). *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia* 80/2, 251-342.
- Ali, M. S. M. 1989. Late Cretaceous echinoids from Gebel El-Rowdah Hatta area, United Arab Emirates. *Neues jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen* 177/3, 393-412.
- Aly, M. F. & Abdel-Gawad, G. I. 2001. Upper Cenomanian-Lower Turonian ammonites from north and central Sinai, Egypt. *El Minia Science Bulletin* 13/2-14/1, 17-60.
- Amard, B., Collignon, M. & Roman, J. 1981. Etude stratigraphique et paléontologique du Crétacé supérieur et Paléocène du Tinrhert-W et Tademait-E (Sahara Algérien). *Documents des Laboratoires de Géologie Lyon, Hors Série* 6, 15-173.
- Amler, M., Fischer, R. & Rogalla, N. 2000. Systematische Übersicht der Familien. In Amler, M. (edited) *Muscheln*, 123-132.
- Ammar, G. & Afifi, T. 1992. Early-Late Cretaceous reef complex facies in North Sinai, Egypt (A model for hydrocarbon exploration). *11th Petroleum Exploration and Production Conference* 2, 577-595.
- Aqrabawi, M. 1993. Oysters (Bivalvia-Pteriomorpha) of the Upper Cretaceous rocks of Jordan: Palaeontology, Stratigraphy and Comparison with the Upper Cretaceous oysters of Northwest Europe. *Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg* 75, 1-136.
- Archiac, A. de. 1835. Mémoire sur la formation crétacée du Sud-Ouest de la France. *Mémoire de la Société géologique de France*, Part 2, 157-192.
- Asan, A. (1997): Latest Cretaceous through Early Eocene Bivalvia of the Farafra Oasis, Systematics and Paleoecology. *Unpublished M. Sc. Thesis, Ain Shams University*, 185 pp.
- Awad, G. H. 1952. The Nerineas of Sinai (with a note on the mode of these

- extinct gastropods). *Bulletin de l'Institut du Désert d'Egypte* 2/2, 23-29.
- Awad, G. H. & Abdallah, A. M. 1966. Upper Cretaceous in Southern Galala, Eastern Desert with emphasis on neighbouring areas. *Journal of Geology of the United Arab Republic* 10/2, 125-142.
- Awad, G. H. & Fawzi, M. A. 1956. The Cenomanian transgression over Egypt. *Bulletin de l'Institut du Désert d'Egypte* 6/1, 168-184.
- Awad, G. H. & Issawi, B. 1975. Biostratigraphic zonation of Upper Cretaceous-Paleocene in Egypt. *Egyptian Journal of Geology* 18/2, 61-75.
- Bandel, K. & Geys, J. F. 1985. Regular echinoids in the Upper Cretaceous of the Hashemite Kingdom of Jordan. *Ann. Soc. Geol. Nord* 104, 97-115.
- Bandel, K., Kuss, J. & Malchus, N. 1987. The sediments of Wadi Qena (Eastern Desert, Egypt). *Journal of African Earth Sciences* 6, 427-455.
- Barnes, R. D. (1974): Invertebrate Zoology. (3rd edited), Saunders, Philadelphia, 870 pp.
- Bauer, J., Marzouk, A. M., Steuber, T. & Kuss, J. 2001. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Cenomanian - Santonian strata of Sinai, Egypt. *Cretaceous Research* 22, 497-526.
- Bayle, E. 1849. Sur quelques fossiles de la province de Constantine in Fournel, H.: *Richesse minérale de l'Algérie*, 359-379.
- Bengtson, P. 1983. The Cenomanian-Coniacian of the Sergipe Basin, Brazil. *Fossils and Strata* 12, 78 pp.
- Bergquist, H. R. & Cobban, W. A. 1957. Mollusks of the Cretaceous. *Geol. Soc. Amer., Mém.*, 67/2, 871-884.
- Berndt, R. 2003. Cenomanian echinoids from Southern Jordan. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 2, 73-90.
- Berthou, P. Y., Chancellor, G. R. & Lauverjat, J. 1985 Revision of the Cenomanian-Turonian ammonite *Vascoceras* Choffat, 1898, from

- Portugal. *Comunicacoes dos Servicos Geológicos de Portugal* 71/1, 55-79.
- Binyon, J. 1966. Salinity tolerance and ion regulation . In Boolootain, R. A. (edited), *Physiology of Echinodermata. Interscience*, New York, 359-377.
- Blanckenhorn, M. 1890. Beiträge zur Geologie Syriens. Die Entwicklung des Kreidesstem in Mittes und Nord Syriens. Eine Geogn. Palaontolog. Monograph, Kassel.
- Blanckenhorn, M. 1925. Die Seeigelfauna der Kreide Palästinas. *Palaeontographica* 67, 83-113.
- Blanckenhorn, M. 1927. Die fossilen Gastropoden und Scaphopoden der Kreide von Syrien-Palästina. *Palaeontographica* 69, 111-186.
- Blanckenhorn, M. 1934. Die Bivalven der Kreideformation von Syrien-Palästina nebst einem ergänzenden anhang über Brachiopoden, Gastropoden und Pterodonten und einem Überblick über die gesamte Molluskenfauna. *Palaeontographica* 81 A, 161-296.
- Boehm, G. 1895. Beiträge zur Kenntniss der Kreide in den Südalpen. I. Die Schiosi- und Calloneghe-Fauna. *Palaeontographica* 41, 81-148.
- Brongniart, A. 1822. Sur quelque terrains des Craie hors du Basin de Paris. In *Description geologique des environs des Paris* (Cuvier, G. & Brongniart, A.), 80-101.
- Buch, L. Von. 1848-1850. Über Ceratiten. *Phys.Math.Abh. Kgl. Akad. Wiss.*, 1848: 1-30 (issued in parts in 1848, volume published 1850).
- Bullen Newton, R. 1898. On some Cretaceous shells from Egypt. *Geological Magazine* 4/5, 394-403.
- Canerot, J. & Collignon, M. 1981. La faune Albinne de Traiguera (Province de Castellon-Espagne). *Documents des Laboratoires de Géologie Lyon, Hors Série* 6, 227-249.

- Chancellor, G. R. 1982. Cenomanian-Turonian ammonites from Coahuila, Mexico. *Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala*, N.S. 9, 77-129.
- Chancellor, G. R., Kennedy, W. J. & Hancock, J. M. 1994. Turonian ammonite faunas from central Tunisia. *Special Papers in Palaeontology* 50, 118 pp.
- Cherif, O. H., Al-Rifaiy, I. A., Al-Afifi. F. I. & Orabi, O. H. 1989a. Foraminiferal biostratigraphy and paleoecology of some Cenomanian-Turonian exposures in West-Central Sinai, Egypt. *Revue de Micropaléontologie* 31/4, 243-262.
- Cherif, O. H., Al-Rifaiy, I. A., Al-Afifi. F. I. & Orabi, O. H. 1989b. Planktonic Foraminifera and chronostratigraphy of Senonian exposures in West-Central Sinai, Egypt. *Revue de Micropaléontologie* 32/3, 167-184.
- Choffat, P. 1886. Recueil d'études Paléontologique sur la faune Crétacique du Portugal, Volume 1, Espèces nouvelles ou peu connues. *Mém. Soc. Portugal* 17, 1-40.
- Choffat, P. 1891. Recueil d'études Paléontologique sur la faune Crétacique de Torres Vedres. *Mém. Soc. Portugal*, 189-214.
- Choffat, P. 1899. Les Ammonées du Bellasein, des couches à *Neolobites Vibrayeanus*, du Turonien et du Sénonien, second series of Recueil d'études Paléontologiques sur la faune Crétacique du Portugal, Volume 1, Espèces nouvelles ou peu connues: *Section des Travaux Géologiques du Portugal*. 41-86 (1898 imprint).
- Choffat, P. 1902. La faune Crétacique du Portugal. *Mém. Acad. Roy. Sci.* 4, 87-171.
- Chudeau, R. 1909. Ammonites du Damergou (Sahara Meridional). *Bulletin de la Société géologique de France* 4/9, 67-71.

- Cleevely, R. J. & Morris, N. J. 1987. Gastropods. In Smith, A. B. (edited), Fossils of the Chalk. *Palaeontological Association*, Field guides to fossils 2, 128-140.
- Cobban, W. A., Hook, S. C. 1980. The Upper Cretaceous (Turonian) Ammonite Family Coilopoceratidae Hyatt in the Western Interior, United States. *Prof. Pap. U. S. geol. Surv.* 1192, 24 pp.
- Cobban, W. A., Hook, S. C. & Kennedy, W. J. 1989. Upper Cretaceous rocks and ammonites faunas of southwestern New Mexico. *New Mexico Bureau of Mines and Mineral Resources, Memoir* 45, 137 pp.
- Collignon, M. 1971. Gastéropodes et Lamellibranches du Sahara. *Annales de Paléontologie (Invertébrés)* 57/2, 145-202.
- Collignon, M. 1981. Faune Albo-Cénomaniennne de la Formation des Marnes de Kazhdumi, région du Fars-Khuzestan (Iran). *Documents des Laboratoires de Géologie Lyon, Hors Série* 6, 251-291.
- Conrad, T. A. 1852. Description of the fossils in Syria, collected in the Palestine expedition. In Lynch, W. F. Official Report of the United States Expedition to explore the Dead Sea and the River Jordan, 211-235.
- Coquand, H. 1858-1860. Description physique géologie, paléontologie et minéralogique du département de la Charente: Synopsie des animaux et des végétaux fossiles observés dans les formations secondaires de la Charente Inférieure et de la Dordogne. Marseille, 60-303.
- Coquand, H. 1862. Géologie et paléontologie de la région sud de la province de Constantine. *Mémoires de la Société d'Emulation de la provence* 2, 341 pp.
- Coquand, H. 1869. Monographie du genre " Ostrea", terrain crétacé, 115 pp.
- Coquand, H. 1880. Etudes supplementaries sur la paléontologie algerienne faisant suite à la description géologique et paléontologique de la region

- sud de la province de Constantine. *Bull. Acad. Hippone*, 15, 451 pp.
- Cotteau, G. 1861-1867. Paléontologie française. Description de animaux invertébrés commencée par Alcide d'Orbigny. *Terrain Crétacé* 7, echinides réguliers, 894 pp.
- Cotteau, G. 1869. Notice sur les echinides fossiles recueillis par M. Louis Lartet en Syrie et en Idumée, pendant son voyage avec le Duc de Luynes. *Bulletin de la Société Géologique de France* 26/2, 533-538.
- Cotteau, G. & Triger, J. 1855-1869. Echinides du département de la Sarthe, Baillière et fils (Paris), 458 pp.
- Cotteau, G., Peron, P. & Gauthier, V. 1876-1881. Echinides fossiles de l'Algérie, -V. 1 ; pt. 3 (1876), Etage Urgo-Aptien et Albien, 90 pp.; Pt. 4 (1878), Etage Cenomanien, 144 pp.; pt. 5 (1879), Etage Cenomanien, pp. 145-234; V.2 , Pt. 6 (1879), Etage Turonien, 110 pp.; pt. 7 (1881), Etage Senonien, 118 pp.
- Couffon, O. 1936. La période crétacée en Anjou. *Rev. Hydro-Géol. angev.*, 5/1-4, 128 pp.
- Cox, L. R. 1960. General characteristics of gastropod. In Moore, R. C. (edited) *Treatise on Invertebrate paleontology*, Part I (Mollusca 1), I249-I251.
- Cox, L. R. 1969. Morphological terms applied to bivalve shells and soft parts affecting shell. In Moore, R. C. (edited) *Treatise on Invertebrate paleontology*, Part N (Mollusca 6, Bivalvia), N102-N109.
- Dacqué, E. 1903. Mitteilungen über des Kreide complex von Abu Roasch bei Kairo *Palaeontographica* 30, 337-392.
- Dartevelle, E. & Freneix, S. 1957. Mollusques fossiles du Crétacé de la côte occidentale d'Afrique, du Cameroun à l'Angola. II Lamellibranches. *Ann. Mus. Roy. Congo belg. Sci. Géol.* 20, 271 pp.
- Desmarest, A. 1825. Oursin. In Levrault, F. G. (edited), Dictionnaire des

Sciences Naturelles 37, 59-104.

- Dhondt, A. V. 1973. Systematic revision of the subfamily Neitheinae (Pectinidae, Bivalvia, Mollusca) of the European Cretaceous. *Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Mémoire* 176, 101 pp.
- Dhondt, A. V. 1984 Some Spanish Cretaceous bivalves. *Cuadernos de Geologia Iberica* 8, 847-865.
- Dhondt, A. V. 1993. Upper Cretaceous bivalves from Tercis, Landes, SW France. *Bulletin Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre* 63, 211-259.
- Dhondt, A. V. & Dieni, I. 1990. Unusual Inoceramid-Spondylid association from the Cretaceous Scaglia Rossa of Passo del Brocon (Trento, N. Italy) and its palaeoecological significance. *Memorie degli Istituti di Geologia e mineralogia dell' Università di Padova* 42, 155-187.
- Dhondt, A. V. & Dieni, I. 1992. Non rudistid bivalves from Cretaceous rudist Formations. *Geologica Roma* 28, 211-218.
- Dhondt, A. V. & Dieni, I. 1993. Non-rudistid bivalves from Late Cretaceous rudist limestones of NE Italy (Col di Schiosi and Lago di S. Croce areas). *Memorie di Scienze Geologiche* 45, 165-241.
- Dhondt, A. V. & Jagt, J. W. M. 1988. Upper Cretaceous *Liopistha* species in North Western Europe. *Bulletin Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre* 58, 187-197.
- Dhondt, A. V., Malchus, N., Boumaza, L. & Jaillard, E. 1999. Cretaceous oysters from North Africa: origin and distribution. *Bulletin de la Société Géologique de France* 170/1, 67-76.
- Dodd, J. R. & Stanton, R. J. 1981. Paleocology, Concepts and Applications. *Wiley-Intersciences*, New York, 559 pp.
- Douglass, R. C. 1960. Revision of the family Orbitolinidae. *Micropaléontologie* 6/3, 249-270.

- Douvillé, H. 1910. Etudes sur les Rudistes de Sicilie, d'Algérie, d'Egypte, du Liban et de la Perse. *Mémoires de la Société Géologique de France, Paléontologie* 41, 1-84.
- Douvillé, H. 1912. Description des Rudistes de l'Egypte. *Mémoires de l'Institut Egyptien* 6, 237-256.
- Douvillé, H. 1916. Les Terrains secondaires dans le massif du Moghara , à l'est de l'isthme de Suez, d'après les explorations de M. Couyat Barthoux. *Mémoires de l'Académie des Sciences* 54/2, 1-184.
- Douvillé, H. 1928. Les Ammonites de la Craie supérieure en Egypte et au Sinai. *Mémoires des Sciences de l'Institut de France* 60, 1-41.
- Durham, J. W. 1966. Ecology and paleoecology. In Moore, R. C. (edited) Treatise on invertebrate paleontology, Part U, Echinodermata 3 (Volume 1). *Lawrence Kansas University of Kansas press and the Geological Society of America*, 257-265.
- Durham, J. W., Fell, H. B., Fischer, A. G., Kier, P. M., Melville, R. V., Pawson, D. L. & Wagner, C. D. 1966. Echinoids. In Moore, R. C. (edited) Treatise on invertebrate paleontology, Part U, Echinodermata 3. *Lawrence Kansas University of Kansas press and the Geological Society of America*, 211-695.
- Durham, J. W. & Wagner, C. D. 1966. Glossary of morphological terms applied to echinoids. In Moore, R. C. (edited) Treatise on invertebrate paleontology, Part U, Echinodermata 3. *Lawrence Kansas University of Kansas press and the Geological Society of America*, 251-256.
- Eck, O. 1909. Bemerkungen über drei neue Ammoniten aus der oberen ägyptischen Kreide. *Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin* 179-191.
- Eck, O. 1914. Die Cephalopoden der Schweinfurthschen Sammlungen aus der oberen Kreide Ägyptens. *Zeitschrift der Deutschen Geologischen*

Gesellschaft 66, 179-216.

- El-Hedeny, M. M. 2002. Cenomanian – Coniacian ammonites from the west-central Sinai, Egypt, and their significance in biostratigraphy. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 7, 397-425.
- El-Hedeny, M. M., Abdel Aal, A. A., Maree, M. & Seeling, J. 2001. Plicatulid bivalves from the Coniacian-Santonian Matulla Formation, Wadi Sudr, western Sinai, Egypt. *Cretaceous Research* 22, 295-308.
- El-Mahallawy, R. M. 1996. Paleontologic and paleoecologic studies on some late Cretaceous megainvertebrates of West-Central Sinai. *Unpublished Ph. D. Thesis, Ain Shams University*, 235 pp.
- El Qot, G. M. 1998. Paleontological study on some Cretaceous fossils from some localities in North Sinai, Egypt. *Unpublished Msc. Thesis, Zagazig University, Benha Branch* 239 pp.
- El Shazly, S. H. 1999. Coniacian – Santonian pelecypods and gastropods from Wadi Sudr and Wadi Matulla, West Central Sinai, Egypt. *Proceedings of the fourth international Conference on the Geology of the Arab World, Cairo University, Egypt* 2, 817-836.
- El-Sheikh, H. A. 1999. Coniacian – Late Campanian boundaries in Sinai. *Proceedings of the first international Conference on the Geology of Africa, Assiut, Egypt* 2, 5-20.
- El-Sheikh, H. A. & Hewaidy, A. A. 1998. On some Early - Middle Cretaceous larger foraminifera from northern Sinai Egypt. *Egyptian Journal of Geology* 42/2, 497-515.
- El-Sheikh, H. A., Abdelhamid, M. A. M. & El-Qot, G. M. E. 1998. Macrofossils and foraminiferal biostratigraphy and paleoecology of some Cenomanian - Santonian sequences in north and west central Sinai Egypt. *Egyptian Journal of Geology* 42/2, 471-495.
- El-Shinnawi, M. A. 1967. Upper Cretaceous ammonites from Wadi Sudr,

- western Sinai. *Bulletin of the Faculty of Science, Alexandria University* 8/1, 181-198.
- Farag, I. M. & Shata. A. 1954. Detailed geological survey of El-Minsherah area. *Bulletin Institut Desert d'Egypte* 4/2, 5-82.
- Fawzi, M. A. 1959. On the stratigraphical position of *Hemiaster cubicus* Desor. *Bulletin of the Faculty of Science, Alexandria University* 3, 115-124.
- Fawzi, M. A. 1963. La faune Cenomanienne d'Egypte. *Geological Survey of Egypt, Monograph* 2, 133 pp.
- Fayez, A. & Al-Hammad, A. 2002. Oysters and echinoids from the Naur Formation (late Aptian-early Cenomanian) of Central Jordan. *Neues jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 8, 449-464.
- Forbes, E. 1846. Report on the fossil Invertebrata from southern India, collected by Mr. Kaye and Mr. Cunliffe. *Trans. Geol. Soc. London*, series 2, Volume 7 (Lamellibranchs) pp. 139-157.
- Forbes, E. 1850. Figures and descriptions illustrative of British organic remains. *Mem. Geol. Surv. U. K.*, 3, London.
- Fourtau, R. 1898. Révision des échinides fossiles de l'Egypte. *Mémoires de l'Institut Egyptien* 3/8, 612-633.
- Fourtau, R. 1900. Notes sur les échinides fossiles de l'Egypte, 1. *Bulletin de l'Institut Egyptien* 4/1, 165-167.
- Fourtau, R. 1901. Notes sur les échinides fossiles de l'Egypte, 2. *Bulletin de l'Institut Egyptien* 4/2, 131-147.
- Fourtau, R. (1903): Note sur *Hemiaster cubicus* Desor, et ses variations. *Bull. Mus. Hist. Nat.*, 3, 177-180.
- Fourtau, R. 1904. Contribution a l'étude de la faune Crétacique d'Egypte. *Bulletin de l'Institut Egyptien* 4/4, 231-249.
- Fourtau, R. 1906. Contribution à l'étude des échinides fossiles de la craie

supérieure. *Bulletin de l'Institut Egyptien* 4/6, 139-175.

Fourtau, R. (1912): Notes sur les echinides fossiles de l'Egypte 4, *Bulletin de l'Institut Egyptien* 5, 137-176.

Fourtau, R. (1913): Echinides Aptiens d'Egypte et de Syrie. *Bulletin de l'Institut Egyptien* 5/7, 43-58.

Fourtau, R. 1914. Catalogue des invertébrés fossiles de l'Egypte. Terrains Crétacés, 1, Échinodermes. *Geological Survey of Egypt, Palaeontological Series* 2, 109 pp.

Fourtau, R. 1917. Catalogue des invertébrés fossiles de l'Egypte representes dans les collections du Musee de Geologie au Caire. Terrains Crétacés, 2, part. Mollusques, Lamellibranches. *Geological Survey of Egypt, Palaeontological Series* 3, 108 pp.

Fourtau, R. 1921. Catalogue des invertébrés fossiles de l'Egypte. Terrains Crétacés, 3, Échinodermes (Supplément). *Geological Survey of Egypt, Palaeontological Series* 5, 101 pp.

Fraas, O. 1876. Geologisches aus dem Orient. Palaontologische Bestimmung der Schichten Palastina's Gastropoden. *Wurttemb. Naturw. Jahreshfte*. Stuttgart (Ebner & Seubert), 220 pp.

Freneix, S. 1959. Lamellibranches du Crétacé supérieur de France (Protobranches, Prionodontes, Dysodontes) *Congr. Soc. Sav. Dijon* 1959, Section des Sciences, Sous-Section de Géologie Colloque sur le Crétacé Supérieur francais, 175-284.

Freneix, S. 1972. Le Bassin Contire de Tarfaya (Maroc méridional). *Notes et Mémoires du Service Geologique* 228, 255 pp.

Freneix, S. & Lefèvre, R. 1968. Deux espèces nouvelles de *Chondrodonta* et *Neithea* (Bivalves) du Sénonien du Taurus Lycien (Turquie) *Bull. Soc. géol. France* 7/9, 762-776.

- Freneix, S. & Viaud, J.-M. 1986. Huitres du Crétacé supérieur du bassin de Challans-Commequiers (Vendée). Biostratigraphie, Taxonomie, Paleobiologie. *Bulletin trimestriel de la Société Géologique de Normandie et Amis du Muséum du Havre* 73 fasc. 1+2, 14-79.
- Freund, R. & Raab, M. 1969. Lower Turonian ammonites from Israel. *Special Papers in Palaeontology* 4, 83 pp.
- Fürsich, F. T. & Pandey, D. K. 1999. Genesis and environmental significance of Upper Cretaceous shell concentrations from the Cauvery Basin, southern India. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 145, 119-139.
- Gauthier, V. 1889. Descriptions des échinides fossiles recueillis en 1885 et 1886, dans la région sud des hauts plateaux de la Tunisie par M. P. Thomas. *Explor. Sc. Tunisie*, 116 pp.
- Geys, J. F. 1980. *Heterodiadema libycum* (Agassiz & Desor, 1846) a hemicidaroid echinoid from the Campanian of Belgium. *Annales de la Société Géologique du Nord* 99, 449-451.
- Geys, J. F. 1992. Regular echinoids, other than Hemicidaroida from Upper Cretaceous deposits in the Wadi Qena area (Eastern Desert, Egypt). *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique* 62, 139-154.
- Ghorab, M. A. 1961. Abnormal stratigraphic features in Ras Gharib oil fields. *Third Arab Petroleum Congress, Alexandria, Egypt*, 10 pp.
- Goldfuss, A. 1833-1844. Petrefacta Germaniae. Lamellibranchs Volume 2, (1833, pp. 1-68; 1836, 69-140; 1837, 141-224; 1840, 225-312). Gastropoden Volume 3 (1841-1844, pp. 1-121).
- Götz, S. 2003. Biotic interaction and synecology in a Late Cretaceous coral-rudist biostrome of southeastern Spain. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 193, 125-138.

- Greco, B. 1915. Fauna Cretacea dell' Egitto raccolta da Figari Bey. Parte 1. Cephalopoda. *Palaeontographica Italica* 21, 189-231.
- Greco, B. 1916. Fauna Cretacea dell' Egitto raccolta da Figari Bey. Parte 2. Gastropoda. *Palaeontographica Italica* 22, 103 -169.
- Greco, B. 1917. Fauna Cretacea dell' Egitto raccolta da Figari Bey. Parte 3, fasc. 1 Lamellibranchiata. *Palaeontographica Italica* 23, 93-162,
- Greco, B. 1918. Fauna Cretacea dell' Egitto raccolta da Figari Bey. Parte 3, fasc. 2 Lamellibranchiata. *Palaeontographica Italica* 24, 1-58.
- Gregory, J. W. 1898. *Millestroma*, a Cretaceous milleporid coral from Egypt. *Geological Magazine* 4/5, 337-342.
- Gregory, J. W. 1906. Fossil Echinoidea from Sinai and Egypt. *Geological Magazine* 5/3, 216-227.
- Hamza, F. H., Ismail, A. A., El-Saadany, M. A. 1994. Biostratigraphy & Paleoecology of some Cretaceous exposures in Northern Sinai, Egypt. In *proceedings 12th petroleum Exploration & Production Conference* (Egyptian General Petroleum Corporation, Cairo), 482-495.
- Hardenbol, J., Thierry, J., Farley, M. B., Jacquin, T., de Graciansky, P. - C. & Vail, P. R. 1998. Mesozoic and Cenozoic sequence chronostratigraphic framework of European basins, Chart 5. In *Mesozoic and Cenozoic sequence stratigraphy of European basins* (eds de Graciansky, P. - C. Hardenbol, J., Jacquin, T. & Vail, P. R.) *SEPM (Society of Sedimentary Geology) Special Publication* 60.
- Hassan, M. Y. & Abdel-Gawad, N. F. 1995. The occurrence of an Albian horizon at the base of the Cretaceous succession in Abu Roash area, west of Cairo, Egypt. *Middle East Research Center, Ain Shams University, Earth Science Series* 9, 228-250 .
- Hautmann, M. 2001. Taxonomy and phylogeny of cementing Triassic

- Bivalves (Families Prospondylidae, Plicatulidae, Dimyidae, and Ostreidae). *Palaeontology* 44/2, 339-357.
- Holzapfel, E. 1889. Die Mollusken der Aachener Kreide. *Palaeontographica* 35/3-6, 139-268.
- Hook, S. C. & Cobban, W. A. 1981. Late Greenhorn (mid-Cretaceous) discontinuity surfaces, southwest New Mexico. *New Mexico Bureau of Mines & Mineral Resources* 180, pp. 5-21.
- Howarth, M. K. 1985. Cenomanian and Turonian ammonites from the Novo Redondo area, Angola. *Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology* 39/2, 73-105.
- Hyatt, A. 1870. Report on the Cretaceous fossils from the Maroim: in Hartt, C. F. *Geology and physical geography of Brazil*: Fields, Osgood & Co. , Boston, 385-393.
- Ismail, A. A. 2000. Upper Cretaceous stratigraphy and micropaleontology of the western part of the Gulf of Aqaba, East Sinai, Egypt. *Middle East Research Center, Ain Shams University, Earth Science Series* 14, 239-261.
- Issawi, B., El Hinnawi, M., El Khawaga, L., & Labib, S. & Anani, N. 1981 Contribution to the geology of Wadi Feiran area, Sinai, Egypt. *Geological Survey of Egypt, internal report*, 55-88.
- Issawi, B., Osman, R., Francis, M., El Hinnawi, M., El Bagori, Y., Mazhar, A. & Labib, S. 1999. Contribution to the geology of East Sinai. *Annals of the Geological Survey of Egypt* 21 (for 1998) 55-88.
- Kassab, A. 1985. Paleontological and stratigraphical studies of Cretaceous sections in Wadi Qena and Wadi Tarfa, Eastern Desert, Egypt. *Unpublished Ph.D. Thesis, Faculty of Science, Assiut University, Egypt*, 221 pp.

- Kassab, A. S. 1991a. Statistical analysis of a Cretaceous oyster from Egypt. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen* 191, 239-254.
- Kassab, A. S. 1991b. Cenomanian - Coniacian biostratigraphy of the northern Eastern Desert, Egypt, based on ammonites. *Newsletters on Stratigraphy* 25, 25-35.
- Kassab, A. S. 1994. Upper Cretaceous ammonites from the El-Sheikh Fadl – Ras Gharib Road, Northeastern Desert, Egypt. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 2, 108-128.
- Kassab, A. S. 1999. Cenomanian – Turonian boundary in the Gulf of Suez region, Egypt: towards an interregional correlation, based on ammonites. *Geological Society of Egypt, Special Publication* 2 (for 1996), 61-98.
- Kassab, A. S. & Ismael, M. M. 1994. Upper Cretaceous invertebrate fossils from the area northeast of Abu Zuneima, Sinai, Egypt. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen* 191, 221-249.
- Kassab, A. S. & Ismael, M. M. 1996. Biostratigraphy of the Upper Cretaceous sequence of the Gebel Musabaa Salama area, Southwest Sinai, Egypt. *Arab Gulf J. Scient. Res.* 14/1, 63-78.
- Kassab, A. S. & Obaidalla, N. A. 2001. Integrated biostratigraphy and inter-regional correlation of the Cenomanian – Turonian deposits of Wadi Feiran, Sinai, Egypt. *Cretaceous Research* 22, 1-11.
- Kassab, A. S. & Zakhera, M. S. 1995. Maastrichtian and Paleocene bivalves from the Western Desert, Egypt. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen* 196, 227-246.
- Kauffman, E. G. (1969) : Form, Function, and evolution. In R. C. Moore (edited), *Treatise on invertebrate paleontology*, part N, Mollusca 6. *Geological Society of America, Boulder, Colo.*, N129-N205.
- Keller, S. 1982. Die Oberkreide der Sack-Mulde bei Alfeld (Cenomanian-).

- Unter-Coniac): Lithologie, Biostratigraphie und Inoceramen. *Geologisches Jahrbuch A* 64, 3-171.
- Kennedy, W. J. 1984. Systematic Palaeontology and Stratigraphic distribution of the ammonite faunas of the French Coniacian. *Special Papers in Palaeontology* 31, 160 pp.
- Kennedy, W. J. 1994. Cenomanian ammonites from Cassis, Bouches-du-Rhone, France. *Proceedings of the 3 rd Pergola International Symposium, Palaeopelagos Special Publication* 1, 209-254.
- Kennedy, W. J. & Juignet, P. 1981. Upper Cenomanian ammonites from the environs of Saumur, and the provenance of the types of *Ammonites vibrayeanus* and *Ammonites geslinianum*. *Cretaceous Research* 2, 19-49.
- Kennedy, W. J., Wright, C. W. 1984. The Cretaceous ammonite *Ammonite requienianus* d'Orbigny, 1841. *Palaeontology* 27, 131-143.
- Kennedy, W. J., Wright, C. W. & Hancock, J. M. 1987. Basal Turonian ammonites from west Texas *Palaeontology* 30, 27-74.
- Kier, P. M. 1962. Revision of the cassiduloid echinoids. *Smithsonian Miscellaneous collections* 144/3, 262.
- Kollmann, H. A. 1985. Upper Cretaceous gastropods from excavations for the Highways A10 (Charente, France). *Cretaceous Research* 6, 85-111.
- Kora, M. & Hamama, H. 1987a. Biostratigraphy of the Cenomanian – Turonian of Gabal Gunna, Southeastern Sinai, Egypt. *Mansoura Science Bulletin* 14/2, 289-301.
- Kora, M. & Hamama, H. 1987b. Biostratigraphy of the Senonian succession in Bir Safra area, Southeastern Sinai, Egypt. *Mansoura Science Bulletin* 14/2, 303-314.
- Kora, M., Shahin, A. & Semiet, A. 1993. Stratigraphy and macrofauna of the

- in Bir Safra area, Southeastern Sinai, Egypt. *Mansoura Science Bulletin* 14/2, 303-314.
- Kora, M., Shahin, A. & Semiet, A. 1993. Stratigraphy and macrofauna of the Cenomanian exposures in west-central Sinai, Egypt. *Mansoura Science Bulletin* 20/2, 227-260.
- Kora, M., Khalil, H. & Sobhy, M. 2001a. Stratigraphy and microfacies of Some Cenomanian – Turonian successions in the Gulf of Suez region, Egypt. *Egyptian Journal of Geology* 45/1, 413-439.
- Kora, M., Khalil, H. & Sobhy, M. 2001b. Cenomanian – Turonian macrofauna from the Gulf of Suez region: biostratigraphy and palaeobiogeography. *Egyptian Journal of Geology* 45/1, 441-462.
- Kora, M., Hammama, H. & Sallam, H. 2002. Senonian macrofauna from west-central Sinai: biostratigraphy and palaeobiogeography. *Egyptian Journal of Paleontology* 2, 435- 258.
- Kuss, J. & Bachmann, M. 1996. Cretaceous paleogeography of Sinai Peninsula and neighboring areas. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Serie IIa*, 322, 915-933.
- Lamarck, J. B. de. 1801. Système des Animaux sans Vertèbres, Classe première. Les Mollusques, Paris, 51- 142.
- Lamarck, J. B. de. 1806. Sur les fossils des environs de Paris. *Ann., Mus. Histoire Naturelle*, 156- 166.
- Lamarck, J. B. 1818-1819. Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres. Classe onzième. Les Conchifères, Volume 5 (1818): 411-612, Volume 6 (1819): 1-228.
- Lambert, J. 1931-1932. Etude sur les échinides fossiles du nord de l'Afrique. *Mèm. Géol. Soc.* , 16, 228 pp.
- Lambert, J. 1933. Echinides fossiles du Maroc. *Notes Mèm. Serv.Mines Carte. Géol.* , Maroc 27, 79 pp.

- Lambert, J. 1938. Une nouvelle variété de l' *Heterodiadema libycum* Desor, du Cénomane Supérieur de Tamaia (Niger). *Bull. Soc. Géol. France* 5/8, 87-89.
- Lambert, J. & Thiéry, P. P. 1909-1925. Essai de nomenclature raisonnée des échinides, 607 pp.
- Lartet, L. 1873a. Essai sur la Géologie de la Palestine et des contrées avoisinantes telles que l'Égypte et l'Arabie. Deuxième Partie. *Paléontologie, Ann. Sci., Géol.*, (Pelecypods), 49-71.
- Lartet, L. 1873b. Géologie et paléontologie de la Palestine. *Biblio. Ecole Hautes Etudes, Paris Sect. Sc. Natur.* 7, 98 pp.
- Lehner, L. 1937. Fauna und Flora der Fränkischen Albüberdeckenden Kreide. 1. Die Lamellibranchiaten (ohne Inoceramen) herausgegeben von R. Dehm. (Mit Taf. 18-26 und 2 Tabellen im Text). *Palaeontographica* 85, 115-228.
- Lewy, Z. 1975. The geological history of southern Israel and Sinai during the Coniacian. *Israel Journal of Earth Science* 24, 37-43.
- Lewy, Z. 1989. Correlation of lithostratigraphic units in the upper Judea Group (Late Cenomanian – Late Coniacian) in Israel. *Israel Journal of Earth Science* 38, 19-43.
- Lewy, Z., Kennedy, W. J., Chancellor, G. R. 1984. Co-occurrence of *Metoicoceras geslinianum* (d'Orbigny) and *Vascoceras cauvini* Chudeau (Cretaceous Ammonoidea) in the southern Negev (Israel) and its stratigraphic implications. *Newsletters on Stratigraphy* 13, 67-76.
- Lewy, Z. & Raab, M. 1976. Middle Cretaceous stratigraphy of the Middle East. *Annales du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice* 4, 205-221.
- Leymerie, A. 1842. Suite du Mémoire sur le Terrain Crétacé du Département de l'Aube. Part II (Paléont.), Mém. Soc. géol. de France, Volume V, Part 1 (pelecypods), 2-11.

- Leymerie, A. 1846. Statistique Gèologique et Minèralogique du Dèpartment de l'Aube. Atlas. Troyes, Paris and London (pelecypods), 8-12.
- Loriol, P. de. 1887. Notes pour servir à l'étude des Echinodermes. *Recueil Zoologique Suisse* 4/3, 365-399.
- Lozo, F. E. 1944. Biostratigraphic relations of some North Texas Trinity and Fredericksburg (Comanchean) foraminifera. *Amer. Midland Nat.* 31/3, 513-582.
- Lüning, S., Marzouk, A. M., Morsi, A. M. & Kuss, J. 1998. Sequence Stratigraphy of the Upper Cretaceous of central-east Sinai, Egypt. *Cretaceous Research* 19/2, 154-195.
- Luger, P. & Gröshke, M. 1989. Late Cretaceous ammonites from the Wadi Qena area in the Egyptian Eastern Desert. *Paleontology* 32/2, 355-407.
- Lynch, W. F. 1852. Official report of the United States expedition to explore the Dead Sea and the River Jurdan, (J. Murphy, Baltimore) 235pp.
- Mahmoud, I. G. E. 1955. Etudes paleontologiques sur la faune crétacique de massife de Maghara, Sinai, Egypte. *Publications de l'Institut du Desert d'Egypt* 8, 192 pp.
- Malchus, N. 1990. Revision der Kreide-Austern (Bivalvia: Pteriomorphia) Ägyptens (Biostratigraphie, Systematik). *Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen A* 125, 213 pp.
- Mantell, G. 1822. The fossils of the South Downs, or illustrations of the geology of Sussex: Lupton Relfe, London, 327 pp.
- Masse, J.-P., Gallo, M. M., Luperto, S. E. 1998. Albian rudist faunas from southern Italy: Taxonomic, biostratigraphic and paleobiogeographic aspects. *Geobios* 31, 47-59.
- Maxia C. 1941a. *Checchiaia*, nuovo aporraide del Cretaceo superiore della Tripolitania. *Boll. R. Uff. Geol. Italia* 66/3, 1-6.
- Maxia C. 1941b. Molluschi maestrichtiani della Tripolitania. *Bolletino della*

Società Geologica Italiana 60/2-3, 176-191.

Meister, C. 1989. Les ammonites du Crétacé Supérieur d'Ashaka, Nigéria.

Bulletin des Centres de Recherche Exploration-Production Elf-Aquitaine Supplément 13, 1-84.

Meister, C. & Abdallah, H. 1996. Les ammonites du Cénomanien supérieur et du Turonien inférieur de la région de Gafsa-Chotts, Tunisie du centre-sud. *Geobios* 29/5, 3-49.

Meister, C. & Alzouma, K., Lang, J., Mathery, B. & Pascal, A. 1994. Nouvelles données sur les ammonites du Niger oriental (Ténéré, Afrique occidentale) dans le cadre de la transgression du Cénomanien - Turonien. *Geobios* 27, 189-219.

Meister, C. & Rhalmi, M. 2002. Quelques ammonites du Cénomanien-Turonien de la région d'Errachidia-Boundnid-Erfound (partie méridionale du Haut Atlas Central, Maroc). *Revue de Paléobiologie* 21/2, 759-779.

Moon, F. W. & Sadek, H. 1921. Topography and Geology of Northern Sinai. *Part 1. Petrol. Res. Bull.*, 10, 142 pp.

Moore, R. C. (edited) 1960. Treatise on Invertebrate paleontology, Part I Mollusca 1, (Gastropoda). *Lawrence Kansas University of Kansas press and the Geological Society of America*, I84-I351.

Munier-Chalmas, 1881. Note Paléontologique sur les fossiles recueillis par M. Le commandant Roudaire dans son expedition scientifique en Tunisie, in Roudaire: Mission dans les Chotts tunisiens, 59-79.

Neraudeau, D. & Moreau, P. 1989. Paléoécologie et paléobiogéographie des faunes des échinides du Cenomanien nord-aquitain (Charente-Maritime, France). *Géobios* 22/3, 293-324.

Neraudeau, D., Busson, G. & Corneé, A. 1993. Les échinides du

- Cénomannien Supérieur et du Turonien Inférieur du Tinrhert oriental et Central (Sahara algérien). *Annales de Paléontologie* 79/4, 273-313.
- Nielsen, S. 1827. Petrificata Suecana formationis Cretaceae, descripta et iconibus illustrata pars prior, Vertebrata et Mollusca sistens, 1-39.
- Noetling, F. 1897. Fauna of Baluchistan: The fauna of the Upper Cretaceous (Maastrichtian) beds of the Mari Hills. *Palaeont. Indica*, series 16, Volume 1, part 3, 1-79.
- Orabi, O. H. 1993. Biostratigraphy and paleoecology of some Cenomanian-Early Turonian exposures of Wadi Watir and Wadi Taba, southeastern Sinai, Egypt. *Egyptian Journal of Geology* 37/2, 231- 246.
- Orabi, O. H. & Ramadan, F. S. 1995. Contribution to the Stratigraphy and microfacies of the Matulla Formation in southern Wadi Feiran and Wadi Abuira, west-central Sinai, Egypt. *Egyptian Journal of Geology* 39/1, 339- 359.
- Orabi, O. H. & Ismail, A. A. 1993. Cenomanian-Turonian ostracods from west-central Sinai, Egypt. *Scientific Journal of Faculty of Science, Menoufia University* 7, 131- 159.
- Orbigny, A. d'. 1840-1842. Paléontologie française. Terrains Crétacés. 1 Céphalopodes. Masson édité, Paris 662 pp.
- Orbigny, A.d'. 1842-1843. Paléontologie française. Description des Mollusques et Rayonnés fossiles; Terrains Crétacés. 2 Gastéropodes. Masson édité, Paris, 5-456.
- Orbigny, A.d'. 1844-1847. Paléontologie française. Description des Mollusques et Rayonnés fossiles; Terrains Crétacés. 3 Lamellibranches. Masson édité, Paris 1844, pp. 1-288; 1845, 289-448; 1846, 449-520; 1847, 521-807.
- Orbigny, A.d'. 1850. Prodrôme de Paléontologie stratigraphique universelle des animaux Mollusques et Rayonnés. Terrains Crétacés. Masson édité,

- Paris. pp. 622-689.
- Orbigny, A.d'. 1853-1860. Paléontologie française. Description des animaux invertébrés. Terrains Crétacés, 6, Échinodermes. Masson édité, Paris, 596 pp.
- Parnes, A. 1987. Radiation of species of the genus *Radiolites* from the Upper Turonian at Gebel Er-Risha (NE Sinai, Egypt). *Israel Journal of Earth Science* 36, 133-153.
- Peron, A. 1889-91. Description des Mollusques fossiles des Terrains Crétacés de la Région sud des Hauts-Plateaux de la Tunisie recueillis en 1885 et 1886 par M. P. Thomas. In: Exploration Scientifique de la Tunisie, *Imprimerie Nationale* 405 pp.
- Pervinquière, L. 1903. Etude géologique de la Tunisie central. *Carte Géologique de la Tunisie*. De Ruddeval, Paris, 359 pp.
- Pervinquière, L. 1907. Etudes de Paléontologie tunisienne. 1. Céphalopodes des terrains secondaires. *Carte Géologique de la Tunisie*. De Ruddeval, Paris, 438 pp.
- Pervinquière, L. 1912. Etudes de Paléontologie tunisienne II, gastropodes et lammellibranches des Terrains Crétacés. *Carte Géologique de la Tunisie*. De Ruddeval, Paris, 352 pp.
- Pictet, F. J. & Roux, W. 1847-1853. Description des Mollusques Fossiles qui se trouvent dans le Grés Verts des Environs de Genève (Pelecypods), 389-527, 550, 551.
- Pomel, A. 1883. Classification methodique et générale des echinides vivants et fossiles, 131 pp.
- Purchon, R. D. 1968. The biology of the Mollusca.- Pergamon Press, New York, 560 pp.
- Quaas, A. 1902. Beitrag zur Kenntniss der fauna der obersten bildungen Kreide in der Libyschen Wüste (overwegischichten und Blätterthone).

Palaeontographica 30, 153-334.

- Rawson, P. F., Dhondt, A. V., Hancock, J. M. & Kennedy W. J. 1996. Proceedings of the Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries. Brussels 8-16, September, 1995, *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Sciences de la Terre* 66 (supplement), 117 pp.
- Renngarten, V. P. 1964. (en russe): Representatives of Ostreidae family in the Cretaceous deposits of Caucasus Minor. *Tudy geol. Inst. Akad. Nauk SSSR*, Moscou, 96, 88 pp.
- Robaszynski, F., Caron, M., Amédéo, F., Dupuis, C., Hardenbol, J., Gonzales Donoso, J. M., Linares, D. & Gartner, S. 1993. Le Cénomanién de la région de Kalaat Senan (Tunisie centrale): litho-biostratigraphie et interprétation séquentielle. *Revue de Paléobiologie* 12, 351-505.
- Roemer, F. 1849. Texas. Mit besonderer Rücksicht auf deutsche Auswanderung und die physischen Verhältnisse des Landes, 464 pp.
- Roemer, F. 1852. Die Kreidebildungen von Texas und ihre organische Einschlüsse (Pelecypods), 44-81.
- Russo, A., Bossellini, F. R., Mohamed, C. M. & Yusuf, S. M. 1991. Paleoenvironmental analysis and cyclicity of the Mustabil Formation (Cretaceous of central Somalia). *Riv. Itali. Paleont. Strat.* 96, 487-500.
- Said, R. 1971. Explanatory notes to accompany to the geological map of Egypt. *Geological Survey of Egypt, paper* 56, 123 pp.
- Schöbel, J. 1975. Ammoniten der Familie Vascoceratidae aus dem unteren unterturon des Damergou-gebietes, République du Niger. *Special publications of the Palaeontological Institution of Uppsala University* 3, 136 pp.
- Seguenza, G. 1882. Studii geologici e palaeontologici sul Cretaceo Medio dell' Italia Meridionale. *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei* (serie

3) 65-214.

- Schröder, R. & Neumann, M. 1985. Les grands Foraminifères du Crétacé moyen de la région méditerranéenne. *Géobios, Mémoire Spécial* 7, 161 pp.
- Seeling, J. & Bengtson, P. 1999. Cenomanian oysters from the Sergipe Basin, Brazil. *Cretaceous Research* 20, 747-765.
- Seilacher, A. 1984. Constructional morphology of bivalves. Evolutionary path-ways in primary versus secondary soft-bottom dwellers. *Palaeontology* 27/2, 207-237.
- Shahin, A. 1988. Fossil fauna and stable isotopic composition within the Late Cretaceous-Early Tertiary at Gebel Nezzazat, Sinai, Egypt. *Unpublished Ph. D. Thesis, Mansoura University*, 212 pp.
- Sharpe, D. 1849. On *Tylostoma*, a proposed Genus of Gastropodous Mollusks. *Quarterly Journal of the Geological Society* 5, 376-381.
- Sharpe, D. 1850. On the secondary district of Portugal which lies on the North of the Tagus. *Quarterly Journal of the Geological Society* 6, 135-195.
- Smith, A. B. 1995. Late campanian-Masstrichtian echinoids from the United Arab Emirates - Oman border region. *Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology* 51/2, 121-240.
- Smith, A. B. & Bengtson, P. 1991. Cretaceous echinoids from North-Eastern Brazil. *Fossils and Strata* 31, 88 pp.
- Smith A. B., Simmons, M. D. & Racey, A. 1990. Cenomanian echinoids, larger foraminifera and calcareous algae from the Natih Formation, Central Oman Mountains. *Cretaceous Research* 11, p. 29-69 .
- Sobetski, V. A. 1982. Bivalvia. In: Sobetski, V. A. *et al.*, Atlas of the marine

- Late Cretaceous invertebrates of the Precaspian depression. *Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR* 187, 50-166.
- Solger, F. 1903. Über die Jugendentwicklung von *Sphenodiscus lenticularis* Owen und seine Beziehungen zur Gruppe der Tissotien. *Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft* 55, 69-84.
- Sowerby, J. & Sowerby J. de C. 1812-1846. The Mineral Conchology of Great Britain; or coloured figures and descriptions of those remains of testaceous animals or shells which have been preserved at various times and depth in the earth, 7 vols. London.
- Staff, H. Von. & Eck, O. 1908. Ueber Notwendigkeit einer Revision de genus *Neolobites*. *Sitzungcherichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin* 276-284.
- Stanley, S. M. 1968. Post-Paleozoic adaptive radiation of infaunal bivalve mollusks. A consequence of mantle fusion and Siphon Formation. *Journal of Paleontology* 42, 214-229.
- Stanton, T. W. 1901. *Chondrodonta*, a new genus of ostreiform mollusks from the Cretaceous, with descriptions of the genotype and a new species. *Proceed. U. S. Nation. Museum* 24, 301-307.
- Stefanini, G. 1918. Echinidi Cretaceie d' Egitto raccolti da Antonio Figari Bey. *Bolletino della Societa Geologica Italiana* 37, 121- 168.
- Stefanini, G. 1928. Echinidi Mesozoici del Caracorum. *Sped. Ital. Filip.*, 2/6, 151-168.
- Stenzel, H. B. 1971. Oysters, In Moore, R. C. (edited) Treatise on invertebrate Paleontology, Part N, Volume 3 , Mollusca 6, Bivalvia. *Geological Society of America, Boulder and University of Kansas, Lawrence*, N 953-N1224.
- Stephenson, L. W. 1952. Larger invertebrate fossils from the Woodbine Formation (Cenomanian) of Texas. *Geological Survey professional*

- paper 242, 226 pp.
- Stoliczka, F. 1870-71. Cretaceous fauna of southern India: Pelecypoda. *Paleontologica Indica* 6/3, 557 pp.
- Strougo, A. 1995. The earliest Paleocene Bivalvia of Egypt. *Middle East Research Center, Ain Shams University, Earth Science Series* 9, 1-26.
- Summers, W. C. 1983. Physiological and Trophic Ecology of Cephalopods. In Russell-Hunter, W. D. (edited) *The Mollusca, Volume 6, Ecology. Academic Press*, 261-279.
- Szörenyi, E. 1955. Echinides Crétacés de la Bakony. *Geol. Hung., Ser. Paleont.*, 26, 268 pp.
- Taylor, J. D., Cleeveley, R. J. & Morris, N. J. 1983. Predatory gastropods and their activities in the Blachdown Greensand (Albian) of England. *Palaeontology* 26/3, 521-553.
- Trevisan, L. 1937. La fauna ei giacimenti del Cenomaniano di facies africana della Sicilia occidentale. *Mémoire dell'Istituto geologico della Università di Padova* 12, 132 pp.
- Verneuil, de & Lorière, de. 1868. Description des fossiles du Néocomian Supérieure du Ultrillas, 11-12.
- Vyalov, O. S. 1936. Sur la classification des huitres. *Doklady Akad. Nauk SSSR* (comptes rendus Acad. Sci. URSS, new series), *Am. Geol. Inst.* 4/13, No. 1/105, 17-20, Washington.
- Wanner, J. 1902. Die fauna der obserten Weissen Kreide der Libyschen Wüste. *Palaeontographica* 30/2, 91-157.
- Wenz, W. 1938-1944. *Gastropoda Handbuch Paleozoologie*. Berlin, 7 vols., 1639 pp.
- Westermann, G. E. G. 1996. Ammonoid Life and Habitat. In Ammonoid paleobiology, Volume 13/16. *Topics in Geobiology* edited by N. H. Landman, K. Tanabe & R. A. Davis, 607-707.

- Wiedmann, J. 1960. Zur Stammesgeschichte jungmesozoischer Nautiliden unter besonderer Berücksichtigung der iberischen Nautilinae D'Orb. *Palaeontographica* A115 (liefg. 1-6), 144-206.
- Williams, H., Turner, F. J. & Gilbert, C. M. 1954. Petrography: An introduction of the study of rocks in thin sections. W.H. Freeman & Company, San Francisco, 406 pp.
- Wilmsen, M. 2000. Late Cretaceous nautilids from northern Cantabria, Spain. *Acta Geologica Polonica* 50/1, 29-43.
- Woods, H. 1899-1913. A monograph of the Cretaceous lamellibranchia of England. *Monographs of the Palaeontological Society* 705 pp.
- Wright, C. W., Calloman, J. H. & Howarth, M. K. 1996. In Treatise on invertebrate Paleontology, Part L, Mollusca 4, Volume 4: Cretaceous Ammonoidea (edited Kasler, R. L.) *Geological Society of America, Boulder and University of Kansas, Lawrence*, 362 pp.
- Wright, C. W. & Kennedy, W. J. 1981. The Ammonoidea of the plenus Marls and the Middle Chalk. *Palaeontographical Society Monograph*, 148 pp.
- Zaborski, P. M. P. 1996. The Upper Cretaceous ammonite *Vascoceras* Choffat, 1898 in north-eastern Nigeria. *Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology* 52 /1, 61-89.
- Zaghib-Turki, D. 1975. Echinides du Crétacé de Tunisie Centrale etudes systématiques, paléobiométrique et paléoécologique. *These 3 e cycle Univ. Orsay, C.E.R.P.A.B. Contrib.*, 10, 117 pp.
- Zaghib-Turki, D. 1989. Les échinides indicateurs des paléoenvironnements, un exemple dans le Cénomanién de Tunisie. *Ann. Paleont. (Vert.-Invert.)*, 75/2, 63-81.
- Zakhera, M. S. 2002a. Upper Cretaceous (Cenomanian-Maastrichtian) gastropods from west of the Gulf of Suez, Egypt. *Neues jahrbuch für*

Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 225/3, 297-336.

- Zakhera, M. S. 2002b. New record of inoceramid bivalves from the Upper Cretaceous of Eastern Desert and Sinai, and the inoceramid stratigraphy in Egypt. *Egyptian Journal of Paleontology* 2, 345- 357.
- Zakhera, M. S. & Kassab, A. S. 1999. New species of ostreoid bivalves from the Upper Cretaceous (Santonian-Maastrichtian) of Egypt. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 7, 385-396.
- Zakhera, M. S. & Kassab, A. S. 2002. Integrated macrobiostratigraphy of the Cenomanian-Turonian transition, Wadi El-Siq, west-central Sinai, Egypt. *Egyptian Journal of Paleontology* 2, 219- 233.
- Zakhera, M. S. & Kassab, A. S. & Chinzei, K. 2001. *Hyotissocameleo*, a new Cretaceous oyster subgenus and its shell microstructure, from Wadi Tarfa, Eastern Desert of Egypt. *Paleontological Research* 5/2, 77-86.
- Ziko, A., Darwish, M. & Eweda, S. 1993. Late Cretaceous – Early Tertiary Stratigraphy of the Themed area, East Central Sinai, Egypt. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte* 3, 135-149.
- Zittel, K. 1865-1866. Die Bivalven der Gosaugebilde an den Nord-östlichen Alpen. Denkschr. Akad. Wissensch. Wien, Math. Nat. Classe; I Dimyaria, volume 24/ 1, 105 -177 (1865); Volume 25/2, 77-198 (1866).