




Arabic

الملخص العربى

الانسداد المعوى الالتصاقى

يعتبر الانسداد المعوى ضمن اهم المشاكل الجراحية التى تواجه الجراحين ويحدث الانسداد المعوى كنتيجة لوجود التصاقات بين الأمعاء او الفتق بأنواعه وكذلك الأورام السرطانية بالأمعاء ويشكلون جميعا نسبة (٩٥%) من أسباب الانسداد المعوى فى الدول المتقدمة .

الالتصاقات بعد العمليات الجراحية هى عبارة عن اتحاد غير طبيعى للأنسجة وتحدث غالبا بعد تدخل جراحى وتؤدى إلى مضاعفات كثيرة.

على الرغم من ذلك فإن بعض العلماء ينصحون بان نكف عن الخوف من الالتصاقات واعتبارها كمصيبة. حيث ان الغالبية العظمى منها غير مؤذية وفى بعض الأحيان واقية او حتى منقذة للحياة حيث انها ربما تمنع التسرب من الخياطة او تحول دون حدوث موت للخلايا المصابة بالأمعاء او تحيط بالتجمعات الملتهبة. وقد وجد ان معظم العمليات السابقة لحدوث الانسداد المعوى الالتصاقى كانت عمليات الجزء السفلى للجهاز الهضمى.

وقد وجد أيضا ان مرضى الانسداد المعوى الالتصاقى بعد عمليات استئصال الزائدة الدودية او عمليات فى المبيض او قناة فالوب فى السيدات يجب ان يعلموا بحذر شديد فى حالة إخضاعهم للعلاج الغير جراحى حيث ان معظمهم لا يستجيب للعلاج الغير جراحى

ويعتبر دخول المريض المستشفى بمجرد حدوث الانسداد المعوى من أهم العوامل لإخضاع المريض للعلاج الغير جراحى وذلك لمتابعته مدة كافية. كما أنه لا يمكن تحديد زمن محدد لحدوث الانسداد المعوى بعد العمليات الجراحية. وقد وجد ان الالتصاقات تعد المسبب الرئيسى لحدوث الانسداد المعوى وبليها الفتق بأنواعه. وقد اختبرت وسائل ومواد مختلفة وذلك بغرض منع تكوين الالتصاقات ولكن وجد حتى الان القليل منها فقط هو المؤثر.

وهناك تضارب مستمر بين الجراحين حول علاج الانسداد المعوى الالتصاقى هل يكون جراحيا باستكشاف البطن وإزالة الالتصاقات ام بدون جراحة عن طريق تشفيط الأمعاء والراحة وإعطاء المحاليل والأيونات الضرورية للجسم حسب التحاليل حتى عودة وظائف المعدة.