

ARABIC SUMMARY

الملخص العربى

فى هذه البحث الذي تم عمله على اربعين مريضا يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم و الرضى لا يعانون من اي اعراض مرضية من الاذن و الانف .

الرضى مقسومون الى اربعة مجموعات كل مجموعة تتكون من عشرة مرضى .

(١) المجموعة الاولى تاخذ مبني بسر س ٢ مم ثلاث مرات يوميا لمدة شهر .

(٢) المجموعة الثانية تاخذ كابوتن تحتوى ٢٥ مجم ثلاث مرات يوميا لمدة شهر .

(٣) المجموعة الثالثة تاخذ اندرال تحتوى ٢٥ مجم ثلاث مرات يوميا لمدة شهر .

(٤) المجموعة الرابعة تاخذ ابيلات تحتوى ١٥ مجم ثلاث مرات يوميا لمدة شهر .

- مقاومة الانف للهواء تقاس بالنسبة لكل الرضى يتم قياسها باستخدام جهاز لقياس مقاومة الانف للهواء قبل و بعد اخذ الدواء .

- و قد وجدنا فى هذا البحث ان برازوسين يسبب زيادة فى مقاومة الانف للهواء و الكابتوبريل يسبب زيادة ملحوظة فى مقاومة الانف للهواء و كذلك النيفيديين يسبب زيادة كبيرة فى مقاومة الانف للهواء الا ان البروبرانولول لم يسبب اي زيادة فى مقاومة الانف للهواء .