

الملخص العربي

أحضرع ٨٠ مريضاً يعانون من التهابات حادة بالبنكرياس (شديدة الالتهاب) للبحث . قسم المرضى لمجموعتين ، كل مجموعة ٤٠ مريضاً . تناولت المجموعة الأولى مضادات حيوية من الجيل الثالث للكيفالوسبورينان مع الفلاجيل بالإضافة إلى الطرق المتعارف عليها في العلاج في هذه الحالات . عولجت المجموعة الثانية بالطرق المتعارف عليها فقط . وكانت النتائج كالتالي :

فى المجموعة الأولى (المضادات الحيوية) :

تعرض خمسة مرضى لحدوث مضاعفات التهابية موضعية أو عامة بنسبة ١٢.٥% توفي من هذه المجموعة عدد ٢ مرضى بنسبة ٥% .

فى المجموعة الثانية :

تعرض ١٥ مريضاً لحدوث مضاعفات التهابية موضعية أو عامة بنسبة ٣٧.٥% توفي من هذه المجموعة ٧ مرضى بنسبة ١٧.٥% .

وقد خلص البحث إلى أن استخدام المضادات الحيوية الوقائية في حالات التهابات البنكرياس الحادة الشديدة الالتهاب تؤدي إلى خفض نسبة حدوث المضاعفات خاصة الالتهابية منها وكذلك خفض نسبة الوفيات بصورة كبيرة .

ويوصى باستعمال المضادات الحيوية الوقائية في كل مرضى حالات التهابات البنكرياس الحادة الشديدة الالتهاب .