

ARABIC SUMMARY

ملخص عربى

يتضمن الجزء الأول من الرسالة فصل عن التركيب التشريحي لحرف الجفن و ملخص للمراجع الرمدية فيما يختص بأنواع الإلتهابات الجفنية البكتيرية المرضية و الغير مرضية التى توجد عادة على حرف الجفن و الملتحمة أسباب الأنواع المختلفة الأساس المرضى و الصورة المرضية من علامات مرثيه و مرويه و المضاعفات و طرق العلاج من الإلتهابات الجفنية .
يشتمل الجزء الأول أيضاً عن ملخص للمراجع الرمدية فيما يختص بالإلتهاب الجفنى الفطرى و الإلتهاب الجفنى القملى .

يتضمن الجزء الثانى من الرسالة دراسة أكلينيكية لعدد ١٣٠ مريض يعانون من إلتهابات الجفون و ١٠٠ شخص بجفون صحيحة بالفحص الظاهرى يحضرون للعيادة الخارجية لمستشفى بنها الجامعى .

تشمل الدراسة التاريخ المرضى الكامل و فحص العين بطريقة ثابتة منظمه بادئاً بفحص جوانب الجفون من ناحية وجود إحتقان أو قشور أو قرح أو تغير فى الإتجاه للخارج أو للداخل أو تغير فى إتجاه الأهداب و فحص فتحات غدد ميبوميان و فحص الملتحمة بخصوص اللون و الإفرازات و فحص الكيس الدمعى لتبيان أى إرتداد دمعى و فحص قوة الإبصار و إجراء إنكسار للعين .

تشمل الرسالة أيضاً إجراء دراسة بكتيرية و فطرية للمرضى و الأشخاص حيث تأخذ مسحة من حرف الجفون و تزرع فى المزارع البكتيرية و الفطرية الملائمه و يتم التعرف على البكتيريا بصبغها بصبغه جرام و فحصها بالميكروسكوب و إجراء الإختبارات الكيميائية الحيوية المناسبة .

و يتم التعرف على الفطر بالفحص الميكروسكوبى و لون الصبغه الناتجة عنه
تتضمن الدراسة إجراء إختبارات حساسيه للميكروبات المرضية بالمضادات الحيوية .
و تتضمن الدراسة إجراء مناظرة بين فاعلية مركبات السلينيوم و الكورتيزون فى علاج حالات الإلتهاب الجفنى القشرى .

تبين من الدراسة أن هناك أربعة أنواع رئيسية من إلتهابات الجفون يمكن التمييز بينها

بالتفحص الإكلينيكي فقط و هي الإلتهاب الجفنى القشرى و الإلتهاب الجفنى القرصى و

الإلتهاب الجفنى القشرى القرصى و الإلتهاب الجفنى الجانبى .

شملت الدراسة عدد ٢٩ مريض مصاب بالتهاب الجفن القشرى و تمثل نسبة ٢٢.٣ % من مجموع المرضى و ١٩ مريض مصاب بالتهاب الجفن القشرى القرصى و يمثل ٤٤.٦ % من جملة المرضى و ٢٤ مريض مصاب بالتهاب الجفن الجانبى و يمثل نسبة ١٨.٥ % من جملة المرضى و تبين من الدراسة أن الإلتهاب الجفنى القشرى القرصى هو الأكثر شيوعاً يليه الإلتهاب الجفنى القشرى و تبين أيضاً أن إلتهاب الجفن الفطرى و القملى نادر الحدوث .

تبين من الدراسة أيضاً أن إلتهاب الجفون أكثر شيوعاً بين الأطفال و من هم أقل من عشرين

عاماً و وجدت نسبتهم ٥٨.٥ % من مجموع المرضى .

أظهرت الرسالة أيضاً إنتشار المرضى بين الجنسين بنسبة متقاربة ٤٧.٧ % من جملة المرضى

ذكور و ٥٢.٣ % من جملة المرضى إناث .

تبين الدراسة أيضاً إنتشار الإلتهاب الجفنى القرصى فى الذكور أكثر من الإناث .

أظهرت الدراسة أيضاً أن الأتربة و الأبخرة الكيماوية عوامل مساعدة على حدوث إلتهابات الجفون

و أن أخطاء إنكسار النظر ليست ذو أهمية كمعامل مساعدة فى حدوث المرض .

أظهرت الدراسة أيضاً الدور الهام للميكروب المكور العنقودى فى حالات الإلتهاب الجفنى القرصى

و الدور الهام للميكروب العصوى المزدوج فى حالات إلتهاب الجفن الجانبى و يقل دور البكتريا

كثيراً فى حالات إلتهاب الجفن القشرى .

أظهرت الدراسة أيضاً زيادة فى نسبة عزل الميكروب العصوى المزدوج بالنسبة للمراجع

الرمدية و هذا يرجع إلى قلة الوعى الصحى و إتباع عادات صحية سيئة .

أظهرت الدراسة أن فطر تيروسبوروب لا يؤثر بأى صورة فى حدوث إلتهاب الجفن القشرى .

تبين من إختبارات الحساسية أن مركب الباستيرسين أكثر فعالية ضد الميكروب المكور

العنقودى المصاحب لحالات إلتهابات الجفن القرصى و أن مركبات التتراسيكلين و الكلورامفينيكول

أكثر فعالية ضد الميكروب العصوى المزدوج المصاحب لحالات إلتهاب الجفن الجانبى

و أظهرت الدراسة أيضاً أن مركبات السلينيم أكثر فاعلية من مركبات الكورتيزون فى حالات إلتهاب

الجفنى القشرى .