

ملخص

الخلل التكويني للحق الحرقفي هو عبارة عن نمو غير طبيعي للحق الحرقفي وله تأثير واضح على اتزان وميكانيكية عمل مفصل الحوض .

النمو الطبيعي للحق الحرقفي يؤدي الى مفصل حوض طبيعي ومتزن وعلى الجانب الآخر فإن الخلل التكويني للحق الحرقفي يؤدي الى خلل ميكانيكي وطبيعي لمفصل الحوض .

وتبعاً للحقيقة القائلة ان تشكيل الحق الحرقفي يتم خلال الثمانية عشرة شهراً الاولى من العمر (سولتر ١٩٦٢ ؛ ١٩٧٤) لذا فإن التشخيص والعلاج المبكر للعيوب الخلقية للحق الحرقفي يعتبر شىء حيوى لاتخاذ المفصل المصاب .

ان التطور الحالى فى الاساليب الفنية والأجهزة الحديثة للتشخيص أضاف الكثير لتشخيص الخلل التكويني للحق الحرقفي وتحديد تأثيراته الميكانيكية حيث أن الأشعة السينية تعطى صوراً ثابتة بينما الأشعة التليفزيونية وأشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية يمكنها الآن بصورة افضل تشخيص الخلل التكويني للحق الحرقفي وتقييم تأثيراته على اتزان مفصل الحوض .

يجب أن يبدأ علاج الخلل التكويني للحق الحرقفي فى سن مبكرة بقدر المستطاع وفى هذا البحث فإن الخطوط الأساسية للعلاج تم إيضاحها فكل مرحلة سنية على حدا ومع كل صورة مرضية عامة مصاحبة أن وجدت مع الإشارة لما قد يستجد اكلينيكيًا على الحالات التى تم علاجها والأخرى التى لم تعالج .

ولخيرا فانى ارجو أن يكون هذا البحث قد أوفى الغرض منه وأعطى صورة واضحة عن هذا الموضوع.